УкрВетПромПостач
UkrVetPromPostach

2021

КАТАЛОГ

ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ISO 9001:2015

ВЕТПРОМСПІЛКА

GMP

УкрВетПромПостач
UkrVetPromPostach

Надежный и опытный партнер проверенный временем!!!

ООО «Укрветпромпостач» - это современное предприятие в сфере производства ветеринарных препаратов. Философия нашей компании основана на обеспечении здоровья животных только самыми качественными препаратами.

Наши преимущества:

- Европейское качество продукции
- Высококвалифицированные специалисты
- Соответствие стандартам GMP и ISO
- Современное оборудование
- Многоуровневая система водоподготовки
- Многоступенчатая фильтрация воздуха

СОДЕРЖАНИЕ

АНТИБИОТИКИ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ВЕТАБИЦИН-3 3
ВЕТАБИЦИН-5 4
ВЕТАДОКС 5
ВЕТАСЕПТОЛ 7
ВЕТПЕНИЦИЛЛИН 8
ВЕТСТРЕПТОМИЦИНА СУЛЬФАТ 9
КОЛИСТОВЕТ 10
МЕПАТАР 11
НИФУЛИН 12
СУЛЬФАТИЛОЗИН 13

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

АЛЬБЕНДАЗОЛ 10% 14
ВЕТАЗУРИЛ 15
МЕБЕНДАЗОЛ 10% 16
ФЕБОРАЛ 17
ФЕДАЗОЛ 22 20

ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

ВИТАМИН-АДЕВИТ 23
ВИТАМИН-ТЕТРА 25

ПРЕПАРАТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯЛЬНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

ТИМПАНОЛ 27

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ

ВЕТАПИРИН 28
ВЕТСУРФАГОН 29
ОКСИТОЦИН 31

ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ

ВЕТАМАСТ 32
ВЕТАКЛОКС 33
ЦЕФАЛОВЕТ 34

СОДЕРЖАНИЕ

МАЗИ И АНТИСЕПТИКИ

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ ПО ВИШНЕВСКОМУ 35

МАЗЬ БАКТЕРИЦИДНО-АКАРИЦИДНАЯ «ЯМ» 36

МАЗЬ ИХТИОЛОВАЯ 10% 37

МАЗЬ ОКСИТЕТРАЦИКЛИНОВАЯ 1%, 5% 38

МАЗЬ ЦИНКОВАЯ 10% 39

ПРИСЫПКА ДЛЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН 40

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ВАКЦИНА АНТИРАБИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ «ОРИСВАК» 41

ВАКЦИНА АНТИРАБИЧЕСКАЯ ЖИДКАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ ДЛЯ ИММУНИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ РАБИСТАР РЕД (RABISTAR RED) 43

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

ХЛОРСЕПТ 44

БИОЦИД САНДЕЗ 46

СТОП ГРЫЗУН (ПРИМАНКА ДЛЯ ГРЫЗУНОВ) 48

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

НАБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ «АЧС ПЦР-РВ» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 49

НАБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ «АЧС/КЧС ДУО ПЦР-РВ» ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АФРИКАНСКОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 50

НАБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ «CAPRIPOXVIRUS ПЦР-РВ» 51

ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 52

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 53

Ветабицин 3

бензилпенициллина новокаиновая соль - 200 000 ОД
бензилпенициллина натриевая соль - 200 000 ОД
бензилпенициллина бензатин - 200 000 ОД

Лечение КРС, овец, коз, лошадей, свиней, собак, норок, нутрий, кроликов, больных некробактериозом, пастереллезом, пневмонией, маститом, раневой инфекцией и инфекциями мочеполовых путей, септицемией, флегмоной, а также актиномикозом, емфизематическим карбункулом, стрептококковой инфекцией, мытом лошадей, гриппом, стахиботриотоксикозом, инфекционным стоматитом и ринитом, чумой пушных зверей и рожей свиней.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Спектр антимикробного действия аналогичный спектру действия бензилпенициллина. Бактерицидное действие препарата проявляется путем ингибирования синтеза мукопептидов клеточной оболочки микроорганизмов. К препарату чувствительные грамположительные микроорганизмы и некоторые грамотрицательные (стрепто и стафилококки, пневмококки, диплококки, спирохеты, палочки сибирки). К действию препарата стойкие большинство грамотрицательных бактерий, микобактерии, вирусы, простейшие, грибы, рикетсии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат растворяют стерильной дистиллированной водой или 0,5% раствором новокаина, который пролонгирует действие препарата, или физиологическим раствором натрия хлорида и вводят внутримышечно один раз в 7 дней в дозе (тыс. ЕД на 1 кг массы тела): лошади, КРС — 10–15; овцы, козы — 15–20; свиньи — 10–20; собаки, норки, нутрии — 40–50; кролики — 10–25.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных на мясо и употребление молока в пищу разрешается, соответственно, через 14 суток и 3 суток после применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы, закрытые резиновой пробкой под алюминиевую обкатку по 600 000 ЕД.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 ° до 20 ° С. Срок годности 3 года.

Ветабицин 5

бензилпенциллин новокаиновая соль - 300 000 ОД;
бензилпенциллина бензатин - 1 200 000 ОД

Лечение КРС, овец, коз, лошадей, свиней, собак, норок, нутрий, кролей, больных на некробактериоз, сибирку, пастереллез, пневмонию, мастит, метрит, раневую инфекцию, отит, инфекции мочеполовых путей, септицемию, флегмону; эмфизематозный карбункул; стрептококковую септицемию крупного рогатого скота, овец и коз; мыт лошадей, стрептококкоз, стафилококкоз, инфекционный стоматит, ринит; чуму собак (в составе комплексной терапии), рожу свиней.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Бактерицидный препарат, действующее вещество которого (бензилпенициллин) относится к группе пенициллинов, чувствительных к действию β-лактамазы. Спектр антимикробного действия препарата аналогичный спектру действия бензилпенициллина. Бактерицидное действие препарат проявляет путем ингибирования синтеза мукопептидов клеточной оболочки микроорганизмов. К Ветабицину 5 чувствительны грамположительные микроорганизмы *(Staphyloccocus spp., Streptoccocus spp., кроме S. faecalis, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corinebacterium diphtheriae),* грамотрицательные кокки *(Neisseria gonorrhoae, Neisseria meningitidis), Treponema pallidium*. К действию препарата устойчивы большинство граммотрицательных бактерий, микобактерии, грибы, вирусы, простейшие.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Суспензию препарата готовят путем растворения препарата 0,5%-раствором новокаина, который пролонгирует действие препарата, или изотоническим раствором натрия хлорида и вводят внутримышечно один раз в 10-15 суток в дозе (тыс. ЕД на 1 кг массы тела): лошади, КРС — 10–15; овцы, козы — 15–20; свиньи — 10–20; собаки — 10-12, норки, нутрии — 40–60; кролики — 10–25.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 20 суток после применения препарата, употребление молока в пищу разрешается через 10 суток после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы, закрытые резиновой пробкой под алюминиевую обкатку по 1 500 000 ЕД.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 ° до 20 ° С. Срок годности 3 года.

Ветадокс

доксициклина гиклат — 50 мг,
тилозина тартрат — 50 мг,
кислота аскорбиновая— 100 мг

Лечение КРС, овец, коз, лошадей, свиней, собак, норок, нутрий, кролей, больных на некробактериоз, сибирку, пастереллез, пневмонию, мастит, метрит, раневую инфекцию, отит, инфекции мочеполовых путей, септицемию, флегмону; эмфизематозный карбункул; стрептококковую септицемию крупного рогатого скота, овец и коз; мыт лошадей, стрептококкоз, стафилококкоз, инфекционный стоматит, ринит; чуму собак (в составе комплексной терапии), рожу свиней.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин - бактериостатический антибиотик, относится к группе тетрациклинов. Механизм действия заключается в нарушении связи аминоацил-тРНК с 30S рибосомальной субъединицей, что приводит к ингибированию синтеза белков в микробной клетке. Препарат обладает широким спектром антимикробного действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий *(Staphylococcus spp., Diplococcus pneumoniae, Streptococcus spp., Haemophilus influenza, E. coli, Pneumococci spp., Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Clostridium perfringes, Listeria monocytogens, Actinomyces spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp.)*, а также микоплазм *(Mycoplasma spp.)*, риккетсий *(Rickettsia spp.)* и хламидий *(Chlamydia spp.)*.
Тилозин - антибиотик группы макролидов, активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Diplococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Neisseria spp., Bacteriodes nodosus, Moraxella bovis, Pasteurella spp., Spirocheta spp.)*. Особенно чувствительны к тилозину микоплазмы *(Mycoplasma gallisepticum, M. hyopneumoniae, M. synoviae, M. meleagridis, M. agalactiae, M. bovigenitalium)*, а также хламидии *(Chlamydia spp.)* и риккетсии *(Rickettsia spp.)*. Механизм действия тилозина заключается в блокировании синтеза белка в бактериальной клетке путем образования комплекса с 50S-субъединицами рибосом.
Аскорбиновая кислота имеет важное значение для жизнедеятельности организма. Участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, обращении крови, нормальном проникновении капилляров, синтеза стероидных гормонов, синтеза коллагена и проколлагена. Повышает устойчивость организма к инфекциям.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перорально с питьевой водой в дозах:
телята (до 3 месяцев) - 1 г на 10 кг массы тела два раза в сутки в течение 3-5 суток;
свиньи, куры (бройлеры, племенные куры, ремонтный молодняк) - 20 г препарата на 10 л питьевой воды в течение 3-5 суток.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять курам-несушкам, яйца которых используют для потребления людей, а также жвачным животным с функционально развитыми преджелудками.
Не назначать животным с нарушением функции печени и почек.
Не применять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами, хинолонами и линкомицином, а также с нестероидными противовоспалительными средствами.
Не применять свиноматкам в период беременности (2-3 триместр).
Убой животных и птицы на мясо разрешают через 7 суток (домашняя птица), 8 суток (свиньи) и 14 суток (телята) после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 10; 50; 100; 200; 500 и 1000 г.
Полиэтиленовые пакеты по 10, 50; 100; 200; 500 и 1000 г.
Полимерные контейнеры по 100, 200, 500 и 1000 г

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое темное, недоступное для детей место при температуре от 5 ° С до 25 ° С.
Срок годности -2 года.
Срок годности после разведения в воде - 24 часа.

Ветасептол

окситетрациклина гидрохлорид - 3,5 г
эритромицин - 1,5 г

Лечение телят (в возрасте до 3-х месяцев), поросят, свиней, собак, кошек, норок, домашней птицы (бройлеров, гусей), больных на метрит, микоплазмоз, а также при заболеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы, инфицированных ранах, вызванных микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину и эритромицину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинация антибиотиков эритромицина и окситетрациклина проявляет синергетическое противомикробное действие. Сочетание этих антибиотиков повышает их эффективность, уменьшает побочное действие и тормозит образование резистентных штаммов. Механизм антибактериального действия Ветасептола заключается в торможении синтеза белков бактериальных клеток, что размножаются. Препарат имеет широкий спектр действия грамположительных и грамотрицательных бактерий *(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Brucella spp., E.coli, Salmonella spp., Bacillus anthracis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Legionella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Corynebacterium spp., Klebsiella spp.)*, а также спирохеты *(Spirochaeta spp.)*, риккетсии *(Rickettsia spp.)*, микоплазмы *(Mycoplasma spp.)* и хламидии *(Chlamydia spp.)*.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перорально, индивидуально или групповым методом с кормом дважды в сутки в течение 3-7 суток в следующих дозах: телята - 3 г препарата на 10 кг м.т.; поросята - 5-6 г препарата на 10 кг м.т.; свиньи (более 30 кг) - 3 г препарата на 10 кг м.т.; собаки, кошки, норки - 0,6-1,5 г препарата на 1 кг м.т.; домашняя птица (бройлеры, гуси) - 0,6-1,5 г препарата на 1 кг м.т.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не выпаивать с молоком.
Убой животных на мясо позволяют через 21 день после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 10; 50; 100; 200 и 500 г.
Полиэтиленовые пакеты по 10, 50; 100; 200 и 500 г.
Бумажные мешки с полиэтиленовой вставкой по 8; 10, 15 и 20 кг.
Бумажные мешки по 8; 10, 15 и 20 кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 °С до 20 °С.
Срок хранения- 2 года.

Ветпенициллин

бензилпенициллина натриевая соль – 1 000 000 ЕД

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, собак, норок, нутрий, кроликов, при некробактериозе, сибирской язве, пастереллезе, пневмонии, мастите, метрите, раневой инфекции, отите, инфекции мочевыводящих путей, септицемие, флегмоне; эмфизематозном карбункуле; стрептококковой септицемии крупного рогатого скота, овец и коз; мыте лошадей, стрептококкозе, стафилококкозе, инфекционном стоматите, рините, роже свиней, вызванных микроорганизмами, чувствительными к пенициллину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Бензилпенициллин - бактерицидный антибиотик, который относится к группе пенициллинов. Бензилпенициллин ингибирует синтез пептидогликана клеточной оболочки, что приводит к лизису делящихся клеток. Бензилпенициллин активен в отношении грамположительных микроорганизмов *(Staphyloccocus spp., Streptococcus spp., кроме Enterococcus faecalis, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium diphtheriae*), грамотрицательных микроорганизмов *(Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis), Treponema pallidum.* К препарату устойчивы большинство грамотрицательных бактерий, микобактерии, грибы, вирусы, *Rickettsia spp., Entamoeba histolytica.*

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Суспензию препарата растворяют в 2–5 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида, или дистиллированной воде, или 0,25%-1%-ного раствора новокаина. Вводят внутримышечно 3-4 раза в сутки. Разовая доза тыс. ЕД/кг м.т. животного: лошади 2–3; КРС 3–5; овцы, козы 4–10; свиньи 6–8, пушные звери и собаки 10–20; кролики 6–10.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после последнего применения препарата. Потребление молока разрешается через 3 суток после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы, закрытые резиновой пробкой под алюминиевую обкатку по 1 000 000 ЕД.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 ° до 20 ° С. Срок годности 3 года.

Ветстрептомицина сульфат

стрептомицина сульфат — 1 000 000 ЕД

Лечение крупного рогатого скота, коз, овец, свиней и лошадей, больных на лептоспироз, отечную болезнь, рожу свиней, туляремию и актиномикоз крупного рогатого скота; больные респираторными и гинекологическими заболеваниями, маститом, менингитом, раневым и послеродовым сепсисом, а также первичные и вторичные инфекции, возбудители которых чувствительны к стрептомицину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Стрептомицин - антибиотик аминогликозидной группы, который продуцируется *Streptomyces globisporus streptomycini*, обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Echerichia coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Leptospira spp.,* и некоторых грамположительных микроорганизмов, включая *Streptococcus spp., Staphylococcus spp.*.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Непосредственно перед применением препарат растворяют в 5 мл изотонического раствора натрия хлорида или дистиллированной воде. Препарат вводят в дозе 10 000 ЕД на 1 кг массы тела животного два раза в сутки с интервалом 12 часов, в течение 5 суток. При лептоспирозе препарат вводят в течение 4-7 суток в дозе 10 000 - 12 000 ЕД на 1 кг массы тела животного.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 7 суток после последнего применения препарата. Потребление молока разрешается через 3 суток после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы, закрытые резиновой пробкой под алюминиевую обкатку по 0,25; 0,5; 1,3; 5,0 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 10° до 25 ° С. Срок годности 3 года.

Колистовет

колистина сульфат – 10 000 000 МЕ

Лечение свиней и домашней птицы (кур-бройлеров, цыплят, семейных пар, ремонтного молодняка, индюков) при заболеваниях пищеварительного тракта (колибактериоз, сальмонеллез и т.д.), вызванных микроорганизмами, чувствительными к колистину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Колистин - антибиотик группы полимиксинов, которые синтезируются аэробной спорообразующей палочкой Bacillus polymyxa. Препарат действует бактерицидно на грамотрицательные бактерии *(E.coli, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae)*. Колистин связывается с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, усиливает ее проницаемость как для внутренних, так и для внеклеточных компонентов, вызывая деструкцию бактериальной клетки. Кроме этого колистин связывает фосфолипид А и нейтрализует биологический эффект бактериального эндотоксина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перорально с кормом или питьевой водой в течение 5-7 суток в дозах:
свиньи - 1 г препарата на 100 кг массы тела или 200 г препарата на 1 тонну корма в сутки;
домашняя птица (куры-бройлеры, цыплята, семейные пары, ремонтный молодняк, индюки) - 7,5 мг на 1 кг массы тела или 100-150 г препарата на 1 тонну корма или 1000 л питьевой воды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных и птицы на мясо разрешают через 3 суток после последнего применения препарата. Потребление яиц разрешают без ограничений.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 10; 50; 100; 200; 500 и 1000 г.
Полимерная тара по 10; 50; 100; 200; 500 и 1000 г.
Бумажные мешки с полиэтиленовой вставкой по 3; 5, 10, 15; 20 кг.
Бумажные мешки по 3; 5, 10, 15; 20 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 10 ° до 25 ° С.
Срок годности 2 года.
Срок годности после растворения в воде - 24 часа.
Срок годности после смешивания с кормом - 5 суток

Мепатар

окситетрациклина гидрохлорид - 5,0 г

Лечение телят до 6 месяцев, свиней, домашней птицы (кур-бройлеров, цыплят, гусей, индюков) при заболеваниях пищеварительного тракта, органов дыхания и мочеполовой системы, вызванных микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Окситетрациклина гидрохлорид является бактериостатическим антибиотиком, который действует на рибосомы бактерий, препятствуя белковому синтезу. Препарат обладает широким спектром антимикробного действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Brucella spp., E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Corynebacterium spp., Klebsiella spp.)*, а также актиномицеты *(Actinomycetes spp.)*, протозойные *(Protozoa spp.)*, спирохеты *(Spirochaetaceae spp.)*, риккетсии *(Rickettsia spp.)*, микоплазмы *(Mycoplasma spp.)* и хламидии *(Chlamydia)*.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат задают с кормом или питьевой водой. Курс лечения - 5-7 суток.
Перорально дважды в сутки в дозе:

Вид животных	Суточная доза
Свиньи, поросята	**3–5 г препарата на 10 кг массы тела**
Телята	**2–4 г препарата на 10 кг массы тела**
Птица (куры, гуси, индюки)	**0,4–1,0 г препарата на 1 кг массы тела**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять курам-несушкам, яйца которых предназначены для использования в пищу людям. Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 10; 50; 100; 200; 250 и 500 г.
Полиэтиленовые пакеты 10; 20; 25; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 ° до 25 ° С.
Срок годности 2 года.

Нифулин

метронидазол - 11 г
фуразолидон - 6,5 г
окситетрациклина гидрохлорид - 2,5 г

Собаки, кошки - при заболеваниях пищеварительного тракта; пушные звери (норки, песцы) - при эймериозе, а также при заболеваниях пищеварительного тракта; голуби - при гистомонозе, эймериозе, сальмонеллезе, трихомонозе. Вызванных бактериями и простейшими, чувствительными к окситетрациклину, метронидазолу и фуразолидону.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Эффективен против простейших *(Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica),* облигатных анаэробных бактерий *(Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus), Fusobacterium spp., Veillonella spp.* Некоторых грамположительных бактерий *(Eubacterium spp., Clostridium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp).* Против *Giardia, Vibrio cholerae, Trichomonas, Coccidia* , а также *E. coli, Enterobacter spp., Campilobacter spp., Salmonella spp* . Препарат обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Brucella spp., Haemophilus spp., E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Erysipelothrix spp., Fusobacterium spp. , Salmonella spp.,* а также на наипростейших *(Protozoa),* микоплазмы *(Mycoplasma spp.)*, риккетсии *(Rickettsia spp.)* и хламидии *(Chlamydia spp.).*

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перорально в дозах:
собаки, кошки - 0,1-0,2 г препарата на 1 кг м.т. 3 раза в сутки с кормом, в течение 7-10 дней;
пушные звери (песцы, норки) - 0,2 - 0,3 г препарата на 1 кг м. т. 3 раза в сутки с кормом в течение 3 суток; голуби - 3 г препарата на 1 кг корма ежесуточно в течение 7- 10 дней.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

При необходимости курс лечения повторяют лишь после 10-дневного перерыва.
Препарат несовместим с: эфедрином гидрохлорид, фенамином.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 10; 50; 100 г.
Полиэтиленовые пакеты по 10, 50; 100 г.
Полимерные контейнеры по 100 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 2° до 20 ° С.
Срок годности 2 года.

Сульфатилозин

сульфадимидин — 17,5 г
триметоприм — 3,5 г
тилозина тартрат — 3,0 г
окситетрациклина гидрохлорид — 5,0 г

Лечение КРС (в возрасте до 3-х месяцев), лошадей, коз и овец (до 3-х месяцев), свиней, собак, кошек, кроликов, кур (цыплята, бройлеры, ремонтный молодняк), гусей уток, индюков, больных на цистит, мастит, септицемию, колибактериоз, пастереллез, лептоспироз, микоплазмоз, вибриоз, дизентерию, рожу свиней, отечную болезнь, а также при послеродовых осложнения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Компоненты, входящие в состав препарата, обуславливают его широкий спектр антибактериальной активности в отношении грамположительных *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Campylobacter spp.)* и грамотрицательных бактерий *(E. coli, Bordetella spp., Salmonella spp. , Klebsiella spp., Pasterella spp., Proteus spp., Campylobacter spp),* а также актиномицетов, лептоспир, микоплазм *(Mycoplasma spp.),* риккетсий *(Rickettsia spp.),* спирохет *(Spirochetes).* Комплексный препарат имеет широкий спектр бактерицидного и бактериостатического действия, в том числе против микроорганизмов, резистентных к отдельным антибиотикам и химиотерапевтическим препаратам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перорально с кормом или питьевой водой или молоком дважды в сутки в дозе 1,2-1,5 г препарата на 10 кг массы тела с интервалом в 12 часов. Лечение проводят до исчезновения клинических симптомов заболевания и в течение двух последующих суток.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Запрещают применять курам-несушкам, яйца которых предназначены для потребления в пищу людям, а также дойным коровам, молоко которых предназначено для потребления людьми. Убой животных и птицы на мясо позволяют через 10 суток после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 10; 50; 100; 200; 500 г.
Полимерная тара по 10; 50; 100; 200; 500 г.
Бумажные мешки с полиэтиленовой вставкой по 8; 10, 15; 20 кг.
Бумажные мешки по 8; 10, 15; 20 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 10° до 20 ° С.
Срок годности 2 года.

Альбендазол 10%

альбендазол - 10 г

Дегельминтизация крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, плотоядных , птицы при инвазивных заболеваниях, вызванных различными паразитами.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Антигельминтное средство широкого спектра действия, относится к группе бензимидазола, тормозит синтез фумаратредуктазы в организме гельминтов, в свою очередь влияет на цикл Кребса и вызывает уменьшение синтеза гликогена, и на энергетический метаболизм. Эти изменения обусловливают гибель паразита вследствие истощения. Эффективен против взрослых и личиночных форм нематод желудочно-кишечного тракта и легких, а также против цестод и трематод.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат вводится перорально, однократно с кормом

Вид животных	Класс гельминтов	Доза, г/10 кг			
				Нематоды	1,0
	Нематоды Цестоды Трематоды	0,75 0,75 1,0		Нематоды Цестоды Трематоды	2,5 2,5 2,5
	Нематоды Цестоды Трематоды	0,5 0,5 0,75		Нематоды	1,0

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток, а молоко можно использовать в пищу людям через 5 суток после последнего применения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 10; 100; 200; 500,0; 1000,0 г.
Полиэтиленовые пакеты по 10, 100; 200; 500,0; 1000,0 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 15° до 20 ° С.
Срок годности 2 года.

Ветазурил

толтразурил - 25 мг

Лечение кур (бройлеров, ремонтного молодняка кур), индюков, гусей, уток при еймериозе, вызываемых такими видами эймерий:

- *у кур (бройлеров, ремонтного молодняка): Eimeria acervulina, E. brunette, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella;*
- *у индюков: Eimeria adenoides, E. meleagridis, E. meleagrimits;*
- *у гусей, уток: Eimeria anseris, E. truncate*

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Антипротозойное средство для профилактики и лечения эймериоза птицы.
Толтразурил - это синтетическое вещество из группы триазинтриона с высокой степенью безопасности. Имеет еймериоцидное действие на все внутриклеточные стадии развития эймерий в эпителиальных клетках кишечника (эндогенный цикл развития: мерогония, гаметогония). Эффективен против всех видов эймерий. Совместим с витаминами, кормовыми добавками и лекарственными средствами для птицы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат применяют внутрь с питьевой водой в дозе:
1 мл на 1 л питьевой воды в течение 48 часов или 3 мл на 1 л питьевой воды в течение 8 часов.
Раствор с препаратом используют как единственный источник питьевой воды.
При тяжелых случаях эймериоза лечение повторяют через 5 суток.
Растворенный в воде препарат используют в течение 24 часов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой птицы на мясо позволяют через 8 суток после последней обработки препаратом. Во время лечения соблюдать чистоту в помещениях и контролировать влажность воздуха. Необходимо лечить все поголовье птицы одновременно. Для достижения эффективного лечения препарат необходимо применять до возникновения клинических признаков заболевания.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные или стеклянные флаконы по 10, 50, 100, 200, 500, 1000 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5° до 25 ° С.
Срок годности 2 года.
Срок годности после вскрытия 3 месяца.

Мебендазол 10%

мебендазол — 10 г

Лечение животных при нематодозах пищеварительного тракта и легких. КРС, овцы, козы: Haemonchus spp., Nematodirus spp., Trichocephalus spp., Strongyloides spp., Protostrongyloides spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Chabertia spp., Muellerius spp. Лошади: Parascaris eguorum, Strongylus vulgaris, Strongylus eguinus, Triodontophorus spp. Свиньи: Ascaris suum, Oesohagostomum spp., Trichocephalus spp., Strongyloides spp., Metastrongilus spp. Плотоядные: Toxocara spp., Toxascaris spp., Ancylostoma caninum, Uncinaria Stenocephala, Trichuris spp. Птица: аскаридиоз - Ascaridia galli; сингамоз - Syngamus trachea.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Противопаразитарный препарат, влияет на энергетический метаболизм паразитов. Действующее вещество мебендазол тормозит синтез фумаратредуктазы, что влияет на цикл Кребса и вызывает замедление синтеза гликогена. Эти изменения обусловливают гибель паразита вследствие истощения. Эффективен против взрослых и личиночных форм желудочно-кишечных и легочных нематод.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат применяют с небольшим количеством корма, однократно, утром.

Вид животных	Дозы	Вид животных	Дозы
Лошади	6–8 г на 100 кг м.т.	КРС	8–10 г на 100 кг м.т.
Овцы	1 г на 10 кг м.т.	Свиньи	2г на 10 кг м.т.
Собаки	6–8 г на 10 кг м.т.	Фазаны, гуси	1 г на 1 кг м.т.
Куры при сингамозе	1 г на 1 кг м.т.	Куры при аскаридиозе	0,4 г на 1 кг м.т.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток, а молоко использовать в пищу людям через 6 суток после применения препарата. Не применять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами, хинолонами и циклосерином.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 10; 50; 100; 200; 500,0 г.
Полиэтиленовые пакеты по 10, 50; 100; 200; 500,0 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 15° до 20 ° С.
Срок годности 2 года.

Феборал

фенбендазол - 10 г

Профилактика и лечение крупного рогатого скота, овец коз, коней, свиней, птицы при инвазивных заболеваниях.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат владеет антигельминтными свойствами широкого спектра действия. Фенбендазол, действующее вещество, принадлежит к группе бензимидазолов. Эффективен в отношении половозрелых форм личинок и яиц нематод желудочно-кишечного тракта и легких; против некоторых семейств цестод и трематод. Фенбендазол тормозит полимеризацию белков тубулинов в микротубулины, снижает активность энергетических процессов (АТФ и глюкозы), что вызывает паралич мышц и приводит к гибели паразитов.

ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат применяют при следующих заболеваниях вызванных такими возбудителями:

Вид животных	Болезнь	Возбудитель
КРС, овцы, козы	нематоды	
	гемонхоз	*Haemonchus contortus, H.placei, H.similis*
	буностомоз	*Bunostomum trigonocephalum, B.phlebotomum*
	хабертиоз	*Chabertia ovina*
	стронгилоидоз	*Strongyloides papillosus*
	диктиокаулез	*Dictiocaulus filaria, D.viviparus*
	неоаскароз	*Neoascaris vitulorum*
	протостронгилез	*Protostrongylus kochi, Miiellerius capillaris*
	трематоды	
	парамфистоматоз	*Paramphistomum ichikawai, Liorchis scotiae*
	дикроцелиоз	*Dicrocoelium dendriticum*
	цестоды	
	мониезиоз	*Moniezia expansa, M.benedeni*
	эхинококкоз	*Echinococcus granulosus*
	тизаниезиоз	*Thysaniezia giardi*

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Лошади	нематоды	
	стронгилидоз	*Strongylus equinus, S.vulgaris, S.edentatus*
	параскароз	*Parascaris eguorum*
Свиньи	нематоды	
	стронгилоидоз	*Strongyloides ransomi*
	эзофагостомоз	*Oesophagostomum dentatum*
	аскароз	*Ascaris suum*
	метастронгилез	*Metastrongylus spp.*
	цестоды	
	эхинококкоз	*Echinococcus granulosus*
Птица (куры, индюки, утки, гуси)	нематоды	
	аскаридиоз	*Ascaridia galli*
	гетеракидоз	*Heterakis gallinarum*
	амидостомоз	*Amidostomosum anseris*
	капимериоз	*Capillaria anseris*
	сингамоз	*Sungamus trachea*
	тетрамероз	*Tetrameres fissispina*
	стрептокароз	*Streptocara crassicauda*

ДОЗЫ

Перед применением тщательно взболтать.
Препарат вводят внутрь групповым или индивидуальным способом с питьевой водой в дозах:

Вид животных, гельминтозы	Дозировка, мл/10 кг м.т.	Кратность обработок, интервал
Крупный рогатый скот диктиокаулез, неоаскароз, стронгилоидоз	1,0	однократно
дикроцелиоз	3,3	однократно
цистицеркоз	2,5	3, ежесуточно
парамфистоматозы	0,75	5, ежесуточно
Овцы и козы неоаскароз, протостронгилидозы, трихостронгилидозы, стронгилоидоз	0,5	однократно
диктиокаулез, мониезиоз, тизаниезиоз	1,0	однократно
ларвальные цестодозы: эхинококкоз, ценуроз	4,0	3, ежесуточно
дикроцелиоз	2,0	2, ежесуточно
Свиньи аскароз, метастронгилез, трихуроз	1,0	2, через 12 часов
стронгилоидоз, эзофагостомоз	0,5	2, через 12 часов

Профилактика (смешанная инвазия)		
поросята с 2-х до 10 недельного возраста	0,01	один раз, еженедельно
молодняк на откорме до 9 месяцев	0,5	один раз, ежемесячно
эхинококкоз	2,0	5, ежесуточно
Кони параскароз	1,5	однократно
кишечные стронгилятозы	1,0	однократно
стронгилоидоз (жеребята)	0,8	2, ежесуточно
Птица (куры, индюки, утки, гуси) аскаридиоз, гетеракидоз птиц, капилляриоз, амидостомоз, сингамоз, тетрамероз, стрептокароз	1,0	2, ежесуточно

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Забой на мясо разрешается: птица через 3 суток; все остальные животные через 10 суток; использовать молоко в пищу людям через 2 суток после последней обработки животных препаратом.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные флаконы по 50, 100, 200, 500, 1000 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5° до 25° С. Срок годности 2 года.

Федазол 22

фенбендазол — 22 г

Профилактика и лечение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, собак, кошек, кроликов, птицы при инвазивных желудочно-кишечных и респираторных заболеваниях.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Антигельминтное средство широкого спектра действия. Фенбендазол, действующее вещество относится к группе бензимидазолов. Он эффективен в отношении половозрелых форм личинок и яиц нематод желудочно-кишечного тракта и легких; против некоторых семей цестод и трематод. Фенбендазол тормозит полимеризацию белков тубулинов в микротубулины, снижает активность энергетических процессов (АТФ и глюкозы), что вызывает паралич мышц и приводит к гибели паразитов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вид животных	Болезнь	Возбудитель
КРС, овцы, козы	нематоды	
	гемонхоз	*Haemonchus contortus, H.placei, H.similis*
	буностомоз	*Bunostomum trigonocephalum, B.phlebotomum*
	хабертиоз	*Chabertia ovina*
	стронгилоидоз	*Strongyloides papillosus*
	диктиокаулез	*Dictiocaulus filaria, D.viviparus*
	неоаскароз	*Neoascaris vitulorum*
	телязиоз	*Thelazia rhodesi, T.gulosa, T.skrjabini*
	протостронгилез	*Protostrongylus kochi, Miiellerius capillaris*
	трематоды	
	парамфистоматоз	*Paramphistomum ichikawai, Liorchis scotiae*
	дикроцелиоз	*Dicrocoelium dendriticum*
	цестоды	
	мониезиоз	*Moniezia expansa, M.benedeni*
	эхинококкоз	*Echinococcus granulosus*
	тизаниезиоз	*Thysaniezia giardi*

Лошади	нематоды	
	стронгилидоз	Strongylus equinus, S.vulgaris, S.edentatus
	параскароз	Parascaris eguorum
Свиньи	нематоды	
	стронгилоидоз	Strongyloides ransomi
	эзофагостомоз	Oesophagostomum dentatum
	аскароз	Ascaris suum
	метастронгилез	Metastrongylus spp.
	цестоды	
	эхинококкоз	Echinococcus granulosus
Собаки, коты	нематоды	
	токсокароз	Toxocara spp.
	токсаскароз	Toxascaris spp.
	анкилостомоз	Ancylostoma caninum
	унцинариоз	Uncinaria Stenocephala
	цестоды	
	дипилидиоз	Dipylidium caninum
	дифиллоботриоз	Diphyllobotrium latum
	эхинококкоз	Echinococcus granulosus
	трематоды	
	описторхоз	Opisthorchis felineus, O.viverrini, O.sinensis
Кроли	нематодироз	Nematodirus spp.
Птица (куры, индюки, утки, гуси)	нематоды	
	аскаридиоз	Ascaridia galli
	гетеракидоз	Heterakis gallinarum
	амидостомоз	Amidostomosum anseris
	капимериоз	Capillaria anseris
	сингамоз	Sungamus trachea
	тетрамероз	Tetrameres fissispina
	стрептокароз	Streptocara crassicauda

ДОЗЫ

Препарат вводят перорально в дозах:

Вид животных Гельминтоз, заболевание	Дозы, г/10 кг (массы тела)	Количество обработок, интервал
КРС диктиокаулез, неоаскароз, стронгилятозы, стронгилоидоз, телязиоз	0,38	однократно
дикроцелиоз	0,9	5, ежесуточно
цистицеркоз	1,15	3, ежесуточно
парамфистоматоз	0,7	5, ежесуточно

Овцы и козы неоаскароз, протостронгилидоз, трихостронгилидоз, стронгилоидоз	0,23	однократно
диктиокаулез, мониезиоз, тизаниезиоз	0,45	однократно
ларвальные цестодозы: эхинококкоз, ценуроз	1,8	3, ежесуточно
дикроцелиоз	0,9	3, ежесуточно
Свиньи аскароз, метастронгилез, трихуроз, стронгилоидоз	0,45	2, через 12 часов
эзофагостомоз	0,23	2, через 12 часов
профилактика (смешанная инвазия)		
поросята с 2 до 10 недельного возраста	0,046	1 раз, еженедельно
молодняк на откорме	0,23	1 раз, ежемесячно
эхинококкоз	0,9	5, ежесуточно
Лошади параскароз	0,7	однократно
кишечные стронгилятозы	0,45	однократно
стронгилоидоз (молодняк)	0,38	2, ежесуточно
Собаки, коты анкилостоматоз, тениоз, токсаскароз, токсокароз	1,8	3, через 12 часов
Кролики: смешанная нематодозная инвазия	0,7	2, ежесуточно
Птица (куры, индюки, утки, гуси) аскаридиоз, гетеракидоз птицы, капилляриоз, амидостомоз, сингамоз, тетрамероз, стрептокароз	0,45	4–5, ежесуточно

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой на мясо разрешается: птица через 3 суток; все остальные животные через 10 суток. Использовать молоко в пищу людям разрешается через 2 суток после последней обработки животных препаратом.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 100; 200; 250; 500; 1000,0 г.
Полиэтиленовая тара по 100; 200; 250; 500; 1000,0 г.
Бумажные мешки с полиэтиленовой вставкой по 8; 10, 15; 20 кг.
Бумажные мешки по 8; 10, 15; 20 кг.
Полимерные флаконы по 50, 100, 200, 500, 1000 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 15° до 20° С.
Срок годности 2 года.

Витамин-АДЕвит

витамин А - 30 000 МЕ
витамин D3 - 40 000 МЕ
витамин Е - 20,0 мг

Профилактика и лечение у животных А- и D-гиповитаминозов, алиментарной и вторичной остеодистрофии, послеродовой гипокальциемии и гипофосфатемии, пред- и послеродового залеживания, алиментарной дистрофии, бронхита и бронхопневмонии, задержания последа, субинволюции матки, эндометрита, переломов костей, дисплазии суставов.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Витамин А участвует в синтезе белков, липидов, мукополисахаридов; обеспечивает нормальную функцию кожи, слизистых оболочек, а также зрения.
Витамин D3 играет важную роль в поддержании баланса кальция и фосфора в организме.
Витамин Е является природным антиоксидантом. Предотвращает повышенную свертываемость крови, оказывает благоприятное влияние на периферическое кровообращение. Участвует в синтезе белков и гемоглобина, в процессе роста клеток, функции скелетных мышц, сердца и сосудов, половых желез.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат вводят с профилактической целью внутримышечно или подкожно 1 раз в 7 суток, с лечебной целью - внутримышечно 1 раз в 5 суток до выздоровления (5-8 введений), в дальнейшем (при необходимости) препарат вводить в профилактических дозах. При применении препарата рационы животных должны быть сбалансированы по кальцию, фосфору и микроэлементам.

Дозы препарата (расчитаны по витамину $Д_3$):

Вид животных	Доза профилактическая на 7 суток, мл	Доза лечебная на 5 суток, мл
Коровы сухостойные (600 кг)	1,8-2,0	3,5-4,0
Коровы дойные (600 кг)	3,0	5,0
Молодняк (на 100 кг массы тела)	0,7-1,0	1,5-2,0
Быки-производители (на 1 т массы тела)	2,0-2,5	5,0-6,0
Кобылы жеребные	1,0-1,2	2,0
Кобылы кормящие	1,5	2,3-2,5
Жеребята 6–12 мес.	0,4-0,5	1,0-1,5
Свиноматки супоросные	0,4-0,5	1,0-1,5
Свиноматки кормящие	0,5-0,6	1,25-1,3
Поросята массой 30–40 кг	0,15-0,20	0,4-0,5

Овцематки суягные	0,2	0,4-0,5
Овцематки кормящие	0,3	0,6-0,7
Ягнята 4-6 мес.	0,1	0,25
Козы	0,15	0,5
Куры	0,05	0,15
Гуси, индюки	0,1	0,2

Для обогащения рационов животных витамином А необходимо дополнительно вводить препараты с профилактической целью один раз в 7 суток, с лечебной целью один раз в 5 суток в следующих дозах (тыс. МЕ):

- коровам, соответственно, 300-350 и 350-400;
- молодняку (на 100 кг) - 70-80 и 80-90;
- кобылам жеребым - 200 и 400;
- кобылам лактирующим - 250 и 550;
- жеребятам - 50 и 100;
- свиноматкам супоросным - 80 и 150;
- свиноматкам лактирующим - 120 и 150-200;
- поросятам - 40 и 60-80;
- овцематкам суягным - 25 и 70;
- овцематкам лактирующим - 40 и 80;
- козам - 30 и 40; курам - 6,0 и 9,0;
- гусям и индейкам - 15-20 и 30.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять при гипервитаминозах!
Не применять вместе с солями трехвалентного железа и препаратами йода!
Не применять при острых и хронических болезнях печени и почек!
Период выведения отсутствует.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы, объемом 50, 100, 200 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5° до 25 ° С.
Срок годности 12 месяцев.

Витамин-Тетра

витамин А - 50 000 МЕ
витамин D_3 - 25 000 МЕ
витамин Е - 20,0 мг
витамин F - 5,0 мг

Лечение и профилактика у животных и птицы D-гипо-витаминозов (рахита), алиментарной и вторичной остеодистрофии, послеродовой гипокальцемии и гипофосфатемии, пред- и послеродового залеживания, алиментарной дистрофии, бронхита и бронхопнев-монии, задержания последа, субинволюции матки, эндометрита, переломов костей, дисплазии суставов

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Действие препарата обусловлено свойствами витаминов А, D_3, Е и F которые входят в его состав. Препарат способствует нормализации обмена веществ в организме, повышает его резистентность, регулирует минеральный обмен, положительно влияет на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат вводят с профилактической целью внутримышечно или подкожно 1 раз в 7-10 суток, с лечебной целью - внутримышечно 1 раз в 5 суток до выздоровления (5-8 введений), в дальнейшем (при необходимости) препарат вводить в профилактических дозах. При применении препарата рационы животных должны быть сбалансированы по кальцию, фосфору и микроелементам. Дозы препарата рассчитаны по витамину А и поданы в таблице:

Вид животных	Доза профилактическая, мл		Доза лечебная, мл
	на 7 суток	на 10 суток	на 5 суток
Коровы дойные (500 кг)	10–12	15	15
Коровы сухостойные (500 кг)	7–8	10–12	10–12
Молодняк КРС (на 100 кг массы тела)	2–2,5	3–4	2,5–3
Кобылы жеребные	5-6	8	8-10
Жеребята 6-12 месяцев	1,5-2	2,5–3	2,5-3
Свиноматки супоросные	2,5–3	3-4	3–5
Свиноматки лактирующие	3–4	4–5	5–7
Поросята отлученные	0,3-0,4	0,5-0,7	1
Овцематки суягные и подсосные	1–1,2	2	2–2,5
Козы	0,5–0,8	1–1,5	1,5–2
Ягнята и козлята	0,1-0,15	0,2	0,4-0,6
Куры	0,07-0,08	0,1-0,12	0,12-0,2

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять при гипервитаминозах!
Не применять вместе с солями трехвалентного железа и препаратами йода!
Не применять при острых и хронических болезнях печени и почек!
Период выведения отсутствует.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы, объемом 10, 50, 100, 200 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5° до 25 ° С.
Срок годности 12 месяцев.

Тимпанол

семетикон — 10 мл
кислота молочная — 3,5 мл
настойка чемерицы — 3,0 мл
настойка полыни горькой — 2,5 мл

Лечение КРС, коз и овец при остром течении пенистой тимпании рубца. При лечении острого метеоризма кишечника у лошадей.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат, введенный внутрь животному препятствует газообразованию в пищеварительном канале, разрушает пузырьки газа, образовавшиеся в кормовых массах, обеспечивает быстрое выведение их из организма, действует антисептически и руминаторно, усиливает перистальтику, снижает тонус сфинктеров желудка и преджелудков у жвачных животных.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Большому и мелкому рогатому скоту препарат вводят внутрь при помощи резиновой бутылки или непосредственно в полость рубца пищеводным зондом. Можно вводить Тимпанол в полость рубца путем прокалывания брюшной стенки троакаром или иглой для инъекций. Лошадям препарат вводят через пищеводный зонд.
• крупный рогатый скот и лошади — 4–5 мл на 10 кг массы тела;
• овцы, козы — 5–10 мл на 10 кг массы тела;
Перед применением препарат разводят водой в соотношении 1:10 или 1:15 (1 часть тимпанола на 10 или 15 частей питьевой воды). Если симптомы заболевания не исчезают в течение 15–20 мин. после введения - препарат вводят повторно в указанных дозах, но в разведении 1: 5 (1 часть препарата на 5 частей питьевой воды).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Повышенная чувствительность к действующим веществам препарата. Не применять другим животным. Не применять ослабленным или истощенным животным. Не применять одновременно с другими руминаторными средствами.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы стеклянные по 100 мл, 200 мл.
Бутылки стеклянные и полимерные по 250, 330, 500, 1000 и 2500 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 0° до 20 ° С.
Срок годности 1 год.

Ветапирин

цефапирина бензатин - 500 мг

Лечение коров, больных на подострые и хронические эндометриты (не ранее чем через 14 дней после отела), вызванные чувствительными к цефапирину микроорганизмами

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефапирин, входящий в состав препарата, относится к антибиотикам группы цефалоспоринов и обладает широким спектром действия против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *(Staphylococcus spp., Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella spp., Actinobacillus spp., Salmonella spp., Enterobacter spp., Proteus spp. и другие).*

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Внутриматочно с помощью одноразового катетера вводят 19 г препарата (содержимое одной шприц-тубы) однократно. Для этого соединяют шприц-тубу с катетером, на руку надевают полиэтиленовую одноразовую перчатку, захватывают шейку матки рукой, фиксируют через прямую кишку, осторожно вводят катетер со шприцем через шейку матки в полость матки и выжимают содержание поршнем. В случае необходимости процедуру повторяют через 48 часов в той же дозе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 1 сутки после последнего введения препарата.
Не применяется беременным животным!

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные шприц-тубы по 19 г, упакованные в пакет в комплекте с одноразовыми катетерами и перчатками.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 15° до 25 ° С.
Срок годности 2 года.

Ветсурфагон

сурфагон — 0,005 мг

Лечение гипофункции яичников и фолликулярных кист. Для повышения оплодотворяемости маточного поголовья сельскохозяйственных животных, предупреждения эмбриональной смертности при перегулах коров, ранней индукции полового цикла.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат стимулирует выделение гонадотропинов гипофизом максимум через 2-3 часа после введения. Повышенное содержание гонадотропинов в крови сохраняется в течение 4-5 часов после введения. В отличие от природного люлиберина, биологическая активность препарата в 50 раз больше, что позволяет использовать этот препарат в микродозах и короткими курсами. Препарат медленнее, чем естественный люлиберин, разлагается под воздействием ферментов, обеспечивает сильное биологической действие на гипофиз.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат вводят внутримышечно.

- Для ранней индукции полового цикла препарат вводят однократно в дозе 50 мкг на 8-12 день после отела. Осеменения животных проводят не ранее чем через 45 дней после отела.
- Для лечения легкой формы гипофункции яичников препарат вводят двукратно: первый раз - на 8-12 день полового цикла в дозе 50 мкг, второй раз - через 10 суток в дозе 10-25 мкг.
- При выраженной форме гипофункции яичников на 1, 3, 5 дней вводят внутримышечно 10 мл 1% масляного раствора прогестерона, на 7 день вводят Ветсурфагон в дозе 50 мкг.
- Для лечения фолликулярных кист у коров препарат вводят 3 раза с интервалом 24 часа в дозе 25 мкг, на 11 день после первого введения препарата, вводят эстрофан в дозе 250 мкг дважды с интервалом 10-12 часов.
- С целью предупреждения ранней эмбриональной смертности препарат вводят однократно в дозе 50 мкг на 8-12 день после осеменения для повышения функциональной активности желтого тела беременности.
- При двух или более перегулах коров на 10-14 день полового цикла внутримышечно дважды с интервалом 10-12 часов вводят эстрофан в дозе 250 мкг.
- В начале охоты или через 70 часов после введения естрофана вводят 50 мкг Ветсурфагона после чего животных осеменяют. На 8-12 день после осеменения введение Ветсурфагона в дозе 50 мкг повторяют.

- Для повышения оплодотворяемости свиноматок через 24-48 часов после отъема поросят животным вводят 100 МЕ СЖК или ГСЖК и через 56 часов Ветсурфагон в дозе 50 мкг.
- Осеменения свиноматок проводят согласно инструкции.
- С целью повышения оплодотворяемости овцематок препарат вводят в дозе 12-15 мкг.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Применять под наблюдением ветеринарного врача.

ФОРМА ВЫПУСКА

Ампулы по 1, 2, 5, 10, 20 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 0 до 10 ° С.
Срок годности 2 года.

Окситоцин

окситоцин — 10 МЕ

Назначается самкам домашних животных при: гипотонии (первичной, вторичной) и атонии матки; послеродовых маточных кровотечениях; пиометре; задержке последа; стимуляции инволюции матки, послеродовой агалактии.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основным фармакологическим свойством препарата является способность вызывать сильные сокращения мышц матки. Это действие связано с влиянием окситоцина на мембраны клеток миометрия. Под действием окситоцина усиливается проницаемость мембраны для ионов калия, снижается потенциал и повышается возбуждение. Окситоцин повышает секрецию молока, усиливает выработку лактогенного гормона передней доли гипофиза (пролактина).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Применять под наблюдением ветеринарного врача в дозах:

Вид животных	Способ введения и дозы (ЕД)		
	Подкожно или внутримышечно	Внутривенно	Эпидурально
Кобылы и коровы	30–60	20–40	15–30
Свиноматки до 200 кг	30	20	10–15
Козы, овцы	10–15	8–10	-
Собаки	5–10	2–7	-
Кошки	3	2	2

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять при слабо раскрытой шейке матки или неправильном положении плода. Окситоцин не совместим с фибринолизином, норадреналина, метеразин, варфарином натрия. Период выведения (каренции) не определяется.

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные ампулы по 1, 2, 3, 5, 10 см^3; стеклянные флаконы по 5, 10, 20, 50, 100 см^3.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При использовании первой дозы из флакона препарат следует хранить при температуре от 2ºС до 25 ºС, при температуре от 2 ° С до 8 ° С и использовать в течение недели.
Срок хранения 2 года.

Ветамаст

энрофлоксацин - 200 мг
неомицина сульфат - 200 мг
преднизолон - 10 мг

Лечение коров в период лактации при различных формах маститов, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комплексный противомикробный препарат, обладающий высокой антибактериальной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, также проявляет противовоспалительное действие. Применяется для лечения маститов у лактирующих коров.

- Энрофлоксацин активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. *Escherichia coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium perfringes, Bordetella bronchiceptica, Campylobacter spp., Corynebacterium pyogenes, Pseudomonas aerugenosa, Proteus spp., Mycoplasma spp.*
- Неомицина сульфат активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе резистентных к другим антибиотикам (пенициллин, левомицетин, тетрациклин).
- Преднизолон - синтетический ГКС, дегидрированный аналог гидрокортизона. Проявляет противовоспалительное, десенсибилизирующее и противоаллергическое действие, а также обладает противошоковыми и антитоксическими свойствами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Содержание одной шприц-тубы вводят в пораженную четверть молочной железы, которую предварительно выдаивают и дезинфицируют. После введения препарата четверть молочной железы массируют для равномерного распределения его по всей цистерне. Повторное введение через 24 часов в течение 3-5 суток.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 7 суток после последнего введения препарата. Срок употребления молока в пищу людям установлен через 3 суток после последнего введения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные шприц-тубы по 10 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре 15 ° С до 25 ° С
Срок хранения 2 года.

Ветаклокс

клоксациллина бензатиновая соль - 500 мг.

Профилактика и лечение у коров в период сухостоя клинических и субклинических маститов, вызванных микроорганизмами чувствительными к клоксациллину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Антибактериальный препарат для интрацистернального введени.
Клоксациллин - полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда, активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов *(Staphylococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Corynebacterium pyogenes, Neisseria spp., Pseudomonas aeruginosa).* Препарат действует бактерицидно, препятствуя синтезу внешней оболочки клеточной мембраны микроорганизма.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Содержание одной шприц-тубы ввести в каждую четверть молочной железы, которую предварительно выдаивают и дезинфицируют. После введения препарата четверть молочной железы массируют для равномерного распределения его по всей цистерне.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять кормящим коровам и животным в которых сухостойный период меньше 4 недель.
Убой животных на мясо разрешается через 28 суток после последнего введения препарата. Срок употребления молока в пищу людям установлен через 96 часов после отела. В случае если отел состоялся ранее 28 суток после введения препарата, срок употребления молока установлен через 28 суток и 96 часов после лечения.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные шприц-тубы по 4,5 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре 15 ° С до 25 ° С
Срок хранения 2 года.

Цефаловет

цефалексин - 200 мг

Лечение коров в период лактации при клинической и субклинической формах маститов бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами чувствительными к цефалексину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Антибактериальный препарат для интрацистернального применения.
Цефалексин - цефалоспориновий антибиотик первого поколения, обладает широким спектром бактерицидного действия против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий *(Pasteurella spp., Haemophilus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Staphylococcus spp., Salmonella spp., Fusobacterium spp., Clostridium spp. , Klebsiella spp.)*.
После интрацистернального введения, активные вещества быстро распределяются по всей молочной железе. Активные вещества практически не абсорбируются из молочной железы в системный кровоток, не биотрансформируются и выделяются практически в неизменном виде с молоком. Максимальная концентрация препарата в крови достигается в течение 1-2 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Содержание одной шприц-тубы вводят в пораженную четверть молочной железы, которую предварительно выдаивают и дезинфицируют. После введения препарата четверть молочной железы массируют для равномерного распределения его по всей цистерне. Препарат вводят два раза в сутки с интервалом 12 часов. Курс лечения - 2 суток.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Убой животных на мясо разрешается через 4 суток после последнего введения препарата. Срок употребления молока в пищу людям установлен через 2 суток после последнего введения препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полимерные шприц-тубы по 10 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре 15 ° С до 25 ° С
Срок хранения 2 года.

Линимент бальзамический по Вишневскому

деготь березовый - 3,0 г
ксероформ - 3,0 г

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, плотоядных при различных заболеваниях кожи и слизистых оболочек (раны, язвы, пролежни).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат обладает антимикробным действием, эффективен в отношении многих грамположительным *(Staphylococcus spp., Streptococcus spp.)* и грамотрицательных кокков *(Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides),* многим бактериям *(Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp ., Serratia spp., Proteus stuartii, Yersinia spp.).* Линимент имеет адсорбирующее и вяжущее действие, слабо раздражает рецепторы тканей, способствует процессу регенерации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Линимент применяют в виде повязок, аппликаций и тампонов. На место поражения после очистки от шерсти, посторонних предметов, экссудата, некротических тканей или после хирургической обработки накладывают марлевые салфетки, пропитанные линиментом. Сверху накладывают фиксирующую повязку с гигроскопичным слоем (компрессную бумагу, пергамент или клеенка). Смену повязок проводят через 2-3 суток. При открытом методе лечения на раны, язвы, пролежни после тщательной санитарной обработки наносят линимент тонким слоем 2-3 раза в сутки. Раны, имеющие малые поверхности, но глубокие каналы, тампонируют марлевыми салфетками, пропитанными линиментом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Острая мокнущая экзема.
При индивидуальной чувствительности животных к составляющим препарата возможны раздражение кожи.

ФОРМА ВЫПУСКА

Алюминиевые тубы, стеклянные и полимерные контейнеры по 10 г, 20 г, 25 г, 40 г 45 г, 50 г, 60 г, 115 г, 120 г, 150 г, 200 г, 250 г, 400 г, 450 г, 500 г, 900 г, 1 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре 0° С до 20 ° С
Срок хранения 5 лет.

Мазь бактерицидно-акарицидная«ЯМ»

кислота салициловая - 5 г
окись цинка - 10 г
сера - 10 г
деготь березовый - 10 г

Лечение животных при трихофитии (стригущий лишай), экземах, дерматитах и других заболеваниях кожи, поражениях копыт (некробактериоз, копытная гниль у овец), саркоптозе (чесотка), отодектозе, кнемидокоптозе птицы, поражениях дерматофитами, дрожжеподобными грибами рода Candida.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат имеет фунгицидные свойства к *Trichophyton, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum* и бактерицидные свойства в отношении *Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Brucella spp., E. coli, Salmonella spp., Pasteurellapopopo, Proteus spp., Pseudomonas spp., Corynebacterium*, а также противовоспалительные свойства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Мазь наносят тонким слоем, слегка втирая, на пораженные участки кожи и 2-4 см вокруг них. Перед нанесением мази пораженный участок очищают от шерсти, инородных тел, экссудата, некротических тканей. Пораженные участки обрабатывают 1-2 раза в сутки в течение 4-5 суток. Если через 4-5 суток чешуйки НЕ отслоились, втирание мази продолжают. Через 7-10 суток пораженные участки освобождаются от чешуек и на них наблюдается рост шерсти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Острые гнойные процессы.
При индивидуальной чувствительности животных к составляющим препарата возможно раздражение кожи.

ФОРМА ВЫПУСКА

Алюминиевые тубы, полимерные контейнеры по 20, 40, 45, 60, 900 и 1000 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре 0° С до 25° С
Срок хранения 5 лет.

Мазь ихтиоловая

ихтиол - 10 г

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, плотоядных (собак, кошек) при заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты, фурункулез, пиодермии), артритах, невралгиях, бурситах.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мазь обладает антисептическим, противовоспалительным, кератопластическим и местно-обезболивающее действия. После нанесения на раны и слизистые оболочки, кроме антисептического действия, суживает сосуды, уменьшает секрецию и экссудацию, действует обезболивающе и ускоряет регенерацию тканей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Мазь применяют наружно в виде повязок, аппликаций и тампонов. После тщательной очистки от шерсти, посторонних предметов, экссудата, некротических тканей или после гигиенической обработки пораженного участка тела, наносят равномерным слоем мазь 1-2 раза в сутки до исчезновения признаков заболевания. Количество мази зависит от площади пораженной части тела, в среднем используют 5-10 г.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Использовать с осторожностью животным с повышенной чувствительностью к ихтиолу.

ФОРМА ВЫПУСКА

Алюминиевые тубы, стеклянные и полимерные контейнеры по 10, 20, 25, 40, 45, 50, 60, 115, 120, 150, 200, 250, 400, 450, 500, 900 г и по 1 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре 15° С до 25° С
Срок хранения 5 лет.

Мазь окситетрациклиновая 1%

окситетрациклина гидрохлорид - 5 г

Лечение крупного рогатого скота, овец, лошадей, свиней, собак и кошек, больных конъюнктивитом, блефаритом, кератитом, а также при инфицированных ранах, экземах, гнойничковых заболеваниях кожи, трофических язвах, язвах роговицы и других заболеваниях глаз.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Обладает широким спектром антимикробного действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий *(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Brucella spp., E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Corynebacterium spp., Klebsiella spp.),* А также актиномицетов *(Actinomycetes spp.)*, протозойных *(Protozoa spp.)*, спирохет *(Spirochaetaceae spp.)*, риккетсий *(Rickettsia spp.)*, микоплазм *(Mycoplasma spp.)* и хламидий *(Chlamydia spp.)*.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Перед нанесением пораженный участок тщательно очищают от инородных тел, экссудата, некротического материала. Наносят мазь тонким слоем на пораженные участки кожи и на 2-4 см вокруг них, слегка втирая в кожу. Обрабатывают 1-2 раза в сутки. При лечении заболеваний глаз мазь закладывают за нижнее веко 3 раза в сутки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Мазь не рекомендуется применять одновременно с пенициллинами, цефалоспоринами, хинолонами и циклосерин.

ФОРМА ВЫПУСКА

Алюминиевые тубы, стеклянные и полимерные контейнеры по 10, 20, 25, 45, 50, 60, 115, 120, 150, 200, 250, 400, 450, 500 и 900 г 1 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре 5° С до 25° С
Срок хранения 5 лет.

Мазь цинковая 10%

окись цинка - 10 г

Лечения крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, свиней, собак, кошек при дерматите, пиодермии, экземе, язве кожи с явлениями екструдации.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Противомикробное, вяжущее, подсушивающее действия препарата обусловлены оксидом цинка. Средство на поверхности кожи образует альбуминаты и денатурирует белки. Пленка, при этом образуется, защищает нервные окончания от раздражения и ощущение боли ослабевает. Происходит местное сужение сосудов, снижение их проницаемости, уменьшение экссудации, что предупреждает развитие воспалительного процесса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Применяют наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи и 2-4 см вокруг, слегка втирая. Обрабатывают 1-2 раза в сутки. Перед нанесением мази поверхность кожи очищают от грязи, остатков экссудата, шерсти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Острые гнойные процессы.

ФОРМА ВЫПУСКА

Алюминиевые тубы, полимерные контейнеры по 20, 40, 45, 60, 900 и 1000 г

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре 0° С до 25° С
Срок хранения 2 года.

Присыпка для инфицированных ран

йодоформ - 10 г
стрептоцид - 15 г
борная кислота - 15 г

Лечение крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, свиней, плотоядных (собак, кошек) при заболеваниях кожи (ожоги, раны, экземы, дерматиты, фурункулез, пиодермии), артритах, невралгиях, бурситах.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат обладает антисептическим, вяжущим, подсушивающим действием. Его действие обусловлено фармакологическими свойствами компонентов.

- Йодоформ не вступает в реакцию с органическими веществами, но при определенных условиях из него образуется активный йод. Это происходит под влиянием света, кислорода воздуха, оксигемоглобина и особенно тканевых жидкостей, птомаинов и микробов. Этот процесс происходит медленно, поэтому йод выделяется долго (2-3 ч.). Йод разрушает продукты распада и другие вредные вещества, включая токсины, стимулирует образование грануляции.
- Стрептоцид имеет широкий спектр действия на грамположительные и грамотрицательные бактерии *(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Brucella spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Corynebacterium, klebsiella spp.)*.
- Борная кислота оказывает бактериостатическое действие и слабое раздражающее действие на грануляционные ткани.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат наносится наружно. Перед нанесением пораженный участок очищают от шерсти, инородных тел, экссудата, некротического материала. Припудривают присыпкой (3-5 г) пораженные участки кожи и 2-4 см вокруг них. Обработку проводят 1-2 раза в сутки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Использовать с осторожностью животным с повышенной чувствительностью к йодоформу, при длительном применении может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек

ФОРМА ВЫПУСКА

Пакеты из алюминиевой фольги по 10, 50, 100, 200, 500 г.
Полиэтиленовые пакеты по 10, 50, 100, 200, 500 г.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре 15° С до 20° С
Срок хранения 2 года.

Вакцина антирабическая жидкая инактивированная для иммунизации животных Рабистар ред (RabiStar red)

Одна доза (1 мл) содержит инактивированный антиген против бешенства, штамм SAD Vnukovo-32, с активностью не менее 2 МЕ и гидроксид алюминия в качестве адъюванта.

Вакцину применяют для профилактической и вынужденной вакцинации животных против бешенства.

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вакцинный вирус воспринимается организмом животных как чужеродный агент и активизирует иммунную систему на выработку вируснейтрализующих антител. После однократного применения вакцины защитный уровень антител достигается на 14 день и удерживается на высоком уровне не менее года.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Вакцину вводят внутримышечно или подкожно в дозе 1 см ^{3}.
Схема профилактической вакцинации животных.

Вид животных	Минимальный возраст для вакцинации			Повторное введение	Ревакцинация (после последнего введения)
Плотоядные	От вакцинированных самок	с 3 месяцев		Через 12 месяцев	Каждые 24 месяца
	От не вакцинированных самок	с 1 до 3 месяцев		Через 12 месяцев	Каждые 24 месяца
Лошади	с 6-ти месяцев			Через 12 месяцев	Каждые 24 месяца
	Младше 6-ти месяцев	От вакцинированных самок	с 4 месяцев	Через 1 месяц после 1-го введения	Каждые 24 месяца
		От не вакцинированных самок	с 2 месяцев		
Жвачные	Старше 9 месяцев		с 9 месяцев	Через12 месяцев	Каждые 24 месяца
	Младше 6 месяцев	От вакцинированных самок	с 4 месяцев	Обязательно в возрасте с 9 до 12месяцев	Каждые 24 месяца
		От не вакцинированных самок	с 2 месяцев		

СХЕМА ВЫНУЖДЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ

Вид животных	Первое введение	Второе введение	Третье введение	Четвертое введение
Плотоядные, лошади, жвачные, свиньи	Не позже 24–36 часов с момента возможного инфицирования	Через 12 часов после первого введения	Через 12 часов после второго введения	Через 14–16 суток

Примечание:

- для плотоядных, лошадей, жвачных - возможно ежегодное проведение ревакцинации, в зависимости от эпизоотической ситуации на территории или законодательства государства;
- при проведении вынужденной вакцинации животных, подозрительных на заражение бешенством, обязательно нужно проводить комплекс мероприятий в соответствии с «Инструкцией о мерах по профилактике и борьбе с бешенством животных».

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

НЕ вакцинировать клинически больных животных.
Не смешивать с другими вакцинами или иммунологическими препаратами.
- перед применением вакцину тщательно взболтать и довести температуру препарата до комнатной от 15 до 25 ºС;
- вакцинированных животных не следует тренировать или подвергать физическим нагрузкам в течение одной недели после вакцинации.
Период выведения - 0 дней.
Из общих соображений не следует вакцинировать животных в течение последних 2 недель беременности (манипуляции, беспокойство, появление антител пр.).

ФОРМА ВЫПУСКА

Стеклянные флаконы, закрытые резиновой пробкой под алюминиевую обкатку по 1,0 см^3 ; 2,0 см^3 ; 3,0 см^3 ; 5,0 см^3 ; 6,0 см^3 ; 10,0 см^3 или ампулы по 1,0 см ^{3}; 2,0 см ^{3} ; 3,0 см^3 ; 5,0 см^3 ; 6,0 см^3 ; 10,0 см^3 в термоконтейнере (пенополистирольная коробка) или коробке из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В защищенном от света месте при температуре от 2 ° С до 8 ° С.
Не замораживать.
Срок хранения 24 месяца.

Вакцина антирабическая
для пероральной иммунизации плотоядных животных
«Орисвак»

1 доза содержит 1,8 мл антигена SAD Bern в полимерном блистере, питательную приманку из пищевых и аттрактивныъ компонентов; биологический маркер (антибиотиктетрациклинового ряда) не менее 0,150 г / приманку

Профилактическая вакцинация плотоядных животных против бешенства.

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

После прокусывания полимерного блистера внутри питательной приманки вакцинный вирус попадает на слизистую оболочку полости рта и небной миндалины.Защитный эффект от применения вакцины наблюдается только в не инфицированных животных. Наличие материнских антител к бешенства может влиять на возникновение защитного иммунитета у животных. Формирование иммунитета у вакцинированных животных составляет 21 день и длится минимум 1 год.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Вакцину применяют два раза в год, распространяя вручную или с авиатранспорта. Используют не менее 20 доз вакцины на 1 км^2, в зависимости от эпизоотической ситуации и плотности популяции целевых видов животных. При распространении вакцины авиатранспортом через одинаковые расстояния формируют квадраты на картах, например, 250-500 х 250-500 метров. При этом возможно дополнительное ручное применение вакцины в местах непосредственного обитания животных (норы), из расчета 10 приманок на одну нору.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не применять продуктивным животным.

ФОРМА ВЫПУСКА

Питательная приманка, в которую помещен блистер с антигеном.
Коробки из картона по 48 доз или ящики из гофрированного картона 160, 320, 600-800 доз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в морозильной камере в темном месте при температуре минус 20 °С или ниже. Транспортировка вакцины осуществляется при температуре минус 20 °С или ниже, а для дальнейшего использования и хранения во время раскладки в полевых условиях при температуре от + 2 ° С до +8 ° С не более 3 месяцев.

Хлорсепт

натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 80 -82%.

Препарат применяется для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, помещений для содержания животных и птицы, помещений для хранения и подготовки кормов, транспортных средств, ветпунктов, лабораторий, изделий ветеринарного назначения, для заполнения дезбарьеров

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат обладает противомикробным действием в отношении:
- грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза *(Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus faecalis, Streptococcus suis, Streptococcus intestinalis, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium phlei, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas vulgaris, Bacillus subtilis, Bacillus anthracoides , Brucella abortus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonica, Salmonella thyphimurium, Salmonella enteretidis, Salmonella cholerasuis, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Clostridium perfingens, Actinobacillus pleuropneumonaie, Haemophilus parasuis, Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp., Shigella sonnei, Shigella flexneri)*
- вирусов *(Classical swine fever (Flavivirus), African swine fever (Asfavirus), Newcastle disease (Paramyxovirus), Myxomatosis (Poxvirus), Foot-and-mouth disease (Picornavirus), Aujeszky's disease (Herpesvirus), Egg Drop Syndrome (Adenovirus) , Vaccina virus (Poxvirus), Bovine Rotavirus (Reovirus) Poliovirus (Picornavirus), Talfan / Teschen disease (Picornavirus), Infectious hepatitis (Adenovirus), Bovine enterovirus (ECBO) (Picornavirus), Orthomyxovirus, Pestivirusi, SARS («атипичная пневмония»), Avian influenza («птичий грипп»);*
- грибов рода Candida , патогенных дерматофитов *(Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton gypseum, Microsporum gypseum, Aspergillus niger, Aspergillus flavus)*
- плесневых грибов и спор (в том числе спорообразующих микроорганизмов рода *Bacillus)*;
- возбудителей особо опасных инфекций инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Для приготовления рабочих растворов средства «Хлорсепт» соответствующей концентрации исходят из следующих расчетов (табл. 1). Препарат хорошо растворим в воде, поэтому вода не требует предварительной подготовки (подогрева, добавление вспомогательных веществ и т.д.), также нет ограничений по материалу емкостей.
Рабочие растворы препарата готовят непосредственно перед проведением дезинфекции.

Табл. 1 Приготовление рабочих растворов средства «Хлорсепт»

Концентрация растворов средства(по активному хлору),%	Необходимое количество таблеток на 10 л воды
0,015	1
0,030	2
0,045	3
0,060	4
0,100	7
0,200	14
0,300	20

Дезинфекцию средством «Хлорсепт» проводят следующими методами:
- протирание тряпкой или чисткой щеткой, смоченными в рабочем растворе из расчета 100 мл / м ^{2} ;
- орошение рабочим раствором средства с гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» из расчета 100 мл / м ^{2} ;
- аэрозольным методом с термоопрыскивателей (туманогенератора), моторапылителей или ранцевых (ручных) опрыскивателей из расчета 10 мл / м ^{2} ;
- погружение в раствор, замачивание в растворе, заполнение раствором, добавление маточного раствора или таблеток средства в воду.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Во время работы запрещается принимать пищу, пить, курить. При проведении работ по дезинфекции следует избегать разбрызгивания растворов и попадания средства в глаза, на кожу. После окончания работы, лицо и руки необходимо вымыть водой с мылом. Работы по приготовлению и применению рабочих растворов средства следует проводить в защитной одежде, с использованием средств защиты кожи, органов дыхания и глаз

ФОРМА ВЫПУСКА

Пластиковый контейнер, содержащий 6 таблеток.
Пластиковые банки по 1 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в таре производителя при температуре от 0 °С до 30 °С в темных, крытых, сухих складских помещениях с относительной влажностью не более 80% (при 25 ° С), отдельно от пищевых продуктов и в местах, недоступных для детей. Средство не теряет своих свойств при минусовой температуре.
Срок годности - 2 года.

Биоцид СанДез

дидецилдиметиламония хлорид - 2,0%
дидецилдиметилбензиламония хлорид -10,0%
глютаральдегид - 10,0%
изопропанол - 10,0%

Препарат применяется для мытья и дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, инкубаториев, пунктов искусственного осеменения, транспортных средств, поверхностей, объектов и оборудования, подлежащих ветеринарному надзору, для заполнения дезбарьеров

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат обладает бактерицидным *(Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Brucella abortus, Salmonella enteritidis)*, фунгицидным *(Candida albicans, Trichophyton spp., Microsporum gruseum)*, спороцидным *(Bacillus anthracis)* и вируцидным (вирус болезни Ауески, чумы свиней, миксоматоза, ротавирусы) действиями.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Дезинфекцию проводят после тщательной механической и санитарной очистки поверхностей объектов обеззараживания.
Дезинфекцию проводят методом протирания , орошения , туманообразования и методом генерирования пены. После экспозиции остатки препарата разрушаются факторами внешней среды (не нужно смывать). Для дезинфекции используют водные растворы препарата . Для профилактической дезинфекции используют *0,2 % -ный водный раствор препарата при норме расхода 0,2- 0,25 л на 1 м ^{2} площади.* Экспозиция составляет 30 - 60 минут .
Для вынужденной дезинфекции при инфекционных заболеваниях бактериальной и вирусной етиологии и заключительной дезинфекции используют *0,5 % -ный водный раствор препарата при норме расхода 0,2- 0,25 л на 1 м ^{2} площади.* Экспозиция составляет 60 - 120 минут.
Для обеззараживания поверхностей по режиму туберкулеза используют *0,75 % - 1, 0 % раствор и препарата (7,5-100 мл препарата на 10 л воды).* Экспозиция составляет от 3 до 6 часов.
Для заключительной дезинфекции методом туманообразования используют водный раствор препарата *(0,6 л препарата + 4 л воды / 1000 м ^{3} объема)*. Рабочий раствор распыляют при выключенной вентиляции со временем экспозиции - 2-3 часа.
Для дезинфекции методом пенообразования применяют *0,5 % -ный водный раствор препарата из расчета 1 л рабочего раствора на 3-4 м ^{2} площади.*
В присутствии животных и птицы и для обработки инкубационных яиц используют *0,1 % -ный водный раствор препарата.* Применяют методом распыления (из расчета 1 л рабочего раствора на 3 - 4 м^2 площади) и туманообразования (4 л 0,1% -ного раствора на 1000 м^3 помещения). Для заполнения дезбарьеров и дезковриков используют 0,5 % водный раствор средства. Менять раствор по мере загрязнения или один раз в неделю .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

При использовании препарата в термическом туманогенераторе появляется острый неприятный запах. После обработки помещения необходимо обязательно проветрить. К работе со средством не допускают лиц моложе 18 лет.
Дезинфекцию проводят с соблюдением мер защиты органов дыхания, кожи и глаз (спецодежда, универсальный респиратор, защитные очки, резиновые перчатки).
Все электрические приборы при обработке должны быть отключены.
Запрещается курить, пить, принимать пищу во время выполнения работ по дезинфекции. После окончания работы лицо и руки следует вымыть водой с мылом.
Препарат не совместим с мылом, анионными поверхностно-активными веществами, концентрированными растворами хлора, окислителями.

ФОРМА ВЫПУСКА

Канистры из полиэтилена емкостью 1,5, 10, 30 л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в таре производителя при температуре от 5° С до 25° С в темных, крытых, сухих складских помещениях с относительной влажностью не более 80% (при 25 ° С), отдельно от пищевых продуктов и в местах, недоступных для детей.
Не замораживать!
Срок годности - 3 года.

Стоп-грызун

бромадиолон 0,25%

Уничтожение грызунов: крыс серых (R. Rattus), мышей домашних (M. Musculus).

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Действующее вещество приманки бромадиолон - антикоагулянт кумаринового ряда второго поколения. Обладает выраженными кумулятивными свойствами. Раздражающе действует на кожу. Отравляющий эффект проявляется не ранее чем через 24-36 часов. Грызуны погибают через 3-5 суток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Приманку раскладывают у мест возможного распространения грызунов. Для уничтожения грызунов на площади 250-300 м^2 приманку раскладывают в 7-10 местах, в одно место кладут 100-150 г (4-6 столовых ложек) приманки для уничтожения крыс, и - 20-25 г (1 столовая ложка) для уничтожения мышей. Разложенную приманку периодически проверяют и при необходимости пополняют до тех пор, пока они не останутся нетронутыми (при уничтожении крыс не менее 10 суток, при уничтожении мышей - 20 суток).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Приманку раскладывают в местах, которые недоступны для детей, сельскохозяйственных и домашних животных. Препарат является токсичным для людей, поэтому к работе с ним не допускаются лица, которым не исполнилось 18 лет, беременные женщины и женщины, которые кормят детей, а также лица с заболеваниями, сопровождающимися кровотечениями (язвы, геморрагии и т.п.).
Лица, работающие с приманкой, должны пройти инструктаж по работе с ядовитыми веществами. Обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты (халат, косынка, защитные очки, резиновые перчатки). Не касаться приманки незащищенными руками. После работы руки тщательно вымыть с мылом.

ФОРМА ВЫПУСКА

Полиэтиленовые или бумажные пакеты по 0,1 кг; 0,2 кг; 0,5 кг; 1,0 кг; 3,0 кг; 5,0 кг; 10,0 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят в упаковке производителя в сухом, прохладном закрытом на ключ помещении, вдали от нагревательных приборов при температуре от 5 до 35°С. Срок хранения — 3 года.

НАБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ «АЧС ПЦР-РВ» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

- набор реактивов для проведения полимеразной цепной реакции (амплификации)
- набор контрольных образцов

Используется для диагностики африканской чумы свиней метод ПЦР в режиме реального времени, предназначенный для выявления вирусной ДНК африканской чумы свиней (АЧС) в стабилизированной крови свиней, внутренних органах (селезенка, легкие, лимфатические узлы), вируссодержащей культуральной жидкости методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Используется для in vitro диагностики. Набор диагностический «АЧС ПЦР-РВ» предназначен для выявления ДНК вируса АЧС методом ПЦР в режиме реального времени.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В основе диагностического набора «АЧС ПЦР-РВ» для диагностики африканской чумы свиней методом ПЦР в режиме реального времени лежит выделение в исследуемой пробе ДНК возбудителя и последующая амплификация специфического участка ДНК вируса АЧС с использованием специфических олигонуклеотидных праймеров и фермента Taq-полимеразы. Детекция продуктов ПЦР осуществляется в режиме реального времени с использованием специального оборудования (амплификаторов производства Qiagen, Applied Biosystems, BioRad, или подобных). Материалами для исследования являются: стабилизированая кровь свиней, внутренние органы (селезенка, легкие, лимфатические узлы и т.п.), вируссодержащая культуральная жидкость.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

С биологическими материалами следует обращаться, как с потенциально опасными.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкие компоненты диагностического набора фасуют в пробирки типа «Eppendorf» из полиэтилена высокого давления. Компоненты системы упаковывают в полиэтиленовые пакеты с застежкой или картонные коробки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты изготовления. В условиях правильного хранения реагенты останутся стабильными до окончания срока хранения. Запрещается применять набор по истечении срока годности или при несоблюдении температурного режима хранения.Хранить и транспортировать диагностический набор и реагенты в морозильной камере при температуре минус 20 ± 2 °С. Срок хранения 5 лет.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

НАБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ «АЧС/КЧС ДУО ПЦР-РВ» ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АФРИКАНСКОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

- набор реактивов для проведения полимеразной цепной реакции (амплификации)
- набор контрольных образцов

Набор диагностический «АЧС/КЧС дуо ПЦР-РВ» для дифференциальной диагностики африканской и классической чумы свиней методом ПЦР в режиме реального времени, предназначенный для определения вирусной ДНК африканской чумы свиней (АЧС) и вирусной РНК классической чумы свиней (КЧС) в стабилизированной крови свиней, внутренних органах, вируссодержащей культуральной жидкости методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Используется для in vitro диагностики. Диагностический набор обеспечивает обнаружение ДНК вируса африканской чумы свиней и РНК вируса классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В основе диагностического набора «АЧС/КЧС дуо ПЦР-РВ» для дифференциальной диагностики африканской и классической чумы свиней методом ПЦР в режиме реального времени лежит выделение в исследуемой пробе ДНК и РНК возбудителя и последующая амплификация специфического участка ДНК и РНК вирусов АЧС и КЧС с использованием специфических олигонуклеотидных праймеров и фермента Taq-полимеразы. Детекция продуктов ПЦР осуществляется в режиме реального времени с использованием специального оборудования (амплификаторов производства Qiagen, Applied Biosystems, BioRad, или подобных).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

С биологическими материалами следует обращаться, как с потенциально опасными.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкие компоненты диагностического набора фасуют в пробирки типа «Eppendorf» из полиэтилена высокого давления. Компоненты системы упаковывают в полиэтиленовые пакеты с застежкой или картонные коробки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты изготовления. В условиях правильного хранения реагенты останутся стабильными до окончания срока хранения. Запрещается применять набор по истечении срока годности или при несоблюдении температурного режима хранения.Хранить и транспортировать диагностический набор и реагенты в морозильной камере при температуре минус 20 ± 2 °С.

НАБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ «CAPRIPOXVIRUS ПЦР-РВ»

- набор реактивов для проведения ПЦР в реальном времени;
- набор контрольных образцов

Набор диагностический «Capripoxvirus ПЦР-РВ» для выявления ДНК вирусов рода Capripoxvirus, в том числе вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота методом ПЦР в режиме реального времени, предназначенный для выявления ДНК вирусов рода Capripoxvirus в стабилизированной крови, смывах носовой и ротовой полостей, кожных узлах (нодулах), внутренних органах, вируссодержащей культуральной жидкости методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Используют для диагностики in vitro. Набор диагностический «Capripoxvirus ПЦР-РВ» предназначен для выявления ДНК вирусов рода Capripoxvirus, в том числе вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота методом ПЦР в режиме реального времени.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В основе диагностического набора «Capripoxvirus ПЦР-РВ» для выявления вирусов рода *Capripoxvirus*, в том числе вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота методом ПЦР в режиме реального времени лежит выделение в исследуемой пробе ДНК и последующая амплификация специфического участка ДНК вирусов рода *Capripoxvirus* с использованием специфических олигонуклеотидных праймеров и фермента Taq-полимеразы. Детекция продуктов ПЦР осуществляется в режиме реального времени с использованием специального оборудования (амплификаторов производства Qiagen, Applied Biosystems, BioRad, или подобных).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

С биологическими материалами следует обращаться, как с потенциально опасными.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкие компоненты диагностического набора фасуют в пробирки типа «Eppendorf» из полиэтилена высокого давления. Компоненты системы упаковывают в полиэтиленовые пакеты с застежкой или картонные коробки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты изготовления. В условиях правильного хранения реагенты останутся стабильными до окончания срока хранения. Запрещается применять набор по истечении срока годности или при несоблюдении температурного режима хранения.Хранить и транспортировать диагностический набор и реагенты в морозильной камере при температуре минус 20 ± 2 °С.

ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Наше предприятие предлагает Вам широкий выбор моделей медицинской и рабочей одежды, которая производится из качественных тканей специального предназначения.

Модели можно купить как на складе готовой продукции, так и заказать индивидуально.

По желанию возможно нанесение на одежду вышивки и шевронов с логотипом Вашего предприятия.

КОСТЮМЫ И ХАЛАТЫ МЕДИЦИНСКИЕ






РАБОЧАЯ ОДЕЖДА



КАМУФЛЯЖНАЯ ОДЕЖДА

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ РАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛИНОЙ 90 см

Для ректального исследования и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Изготовлены из мягкой полиэтиленовой пленки, обеспечивает сохранение тактильной чувствительности.

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ РАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛИНОЙ 35 см

Считанные секунды тратятся при одевании и снятии с рук. Тонкая пленка сохраняет тактильную чувствительность пальцев. Герметичный шов защищает от попадания воды и пыли. Применяются в лабораториях, в складских помещениях, производственных цехах, где необходимо сохранять руки от влаги и агрессивных сред, при исследовании и контакте с мелкими животными, чтобы предотвратить зоонозные болезни, при предоставлении ветеринарной помощи животным, в быту.

ЗАМЕТКИ

СКОРО БУДУТ ДОСТУПНЫ НОВИНКИ

Ветацефур

Гентацеф форте

Цифлувет

Рифтетрациклин

Геомицин ВЕТ

Мастисепт актив

Ветаксимин

Ветафокс

УкрВетПромПостач

UkrVetPromPostach

+38 (04594) 7 00 14
+38 (098) 444 73 55

e-mail: info@vetsnab.com.ua
www.vetsnab.com.ua

Украина, 07403, Киевская обл.,
г. Бровары, ул. Хельсинкской гр. 23 А