

2022

КАТАЛОГ

ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА



**Надійний та
досвідчений
партнер
перевірений
часом!!!**



ТОВ «Укрветпромпостач» - це сучасне підприємство в сфері виробництва ветеринарних препаратів. Філософія нашої компанії заснована на забезпеченні здоров'я тварин тільки найякіснішими препаратами.

Наші переваги:

- Європейська якість продукції
- Висококваліфіковані фахівці
- Відповідність стандартам GMP і ISO 9001:2015
- Сучасне обладнання
- Багаторівнева система водопідготовки
- Багаторівнева фільтрація повітря

- Наша компанія має партнерів по всьому світу та використовує для виробництва сировину найвищої якості
- З кожним роком ми збільшуємо портфель препаратів власного виробництва та слідкуємо за новинками в галузі ветеринарних препаратів



- Ми беремо активну участь у ветеринарних та сільськогосподарських виставках, семінарах, конференціях, щоб тримати руку на пульсі подій
- Якщо Ви маєте такий же інтерес до ведення успішного бізнесу, приносячи користь нації, піклуючись про здоров'я тварин, то ми завжди раді співпраці з Вами!



форма стор.

АНТИБІОТИКИ ТА ПРОТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ							
ВЕТАБІЦИН-3	●	●	●	●	●		7
ВЕТАБІЦИН-5	●	●	●	●	●		8
ВЕТАДОКС	●			●	●		9
ВЕТАСЕПТОЛ	●	●	●	●	●		11
ВЕТПЕНІЦИЛІН	●	●	●	●	●		12
ВЕТСТРЕПТОМІЦИНУ СУЛЬФАТ	●	●	●	●	●		13
КОЛІСТОВЕТ				●	●		14
МЕПАТАР	●			●	●		15
НІФУЛІН					●		16
СУЛЬФАТИЛОЗИН	●	●	●	●	●		17
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ПРЕПАРАТИ							
АЛЬБЕНДАЗОЛ 10%	●	●	●	●	●		18
ВЕТАЗУРИЛ					●		19
МЕБЕНДАЗОЛ 10%	●	●	●	●	●		20
ФЕБОРАЛ	●	●	●	●	●		21
ФЕДАЗОЛ 22	●	●	●	●	●		24
ПРЕПАРАТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОБМІН РЕЧОВИН							
ВІТАМІН-АДЕВІТ	●	●	●	●	●		27
ВІТАМІН-ТЕТРА	●	●	●	●	●		29
ПРЕПАРАТИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКТ							
ТИМПАНОЛ	●	●	●				31
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ							
ВЕТАПІРИН	●						32
ОКСИТОЦИН	●	●	●	●			33
ВЕТСУРФАГОН	●		●	●			34
ГЕОМІЦИН ВЕТ	●						36
РУКАВИЧКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ							37



ПРОТИМАСТИТНІ ПРЕПАРАТИ

ВЕТАМАСТ	●						38
ВЕТАКЛОКС	●						39
ВЕТАКСИМІН	●						40
ЦЕФАЛОВЕТ	●						41

МАЗІ ТА АНТИСЕПТИКИ

ЛІНІМЕНТ БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЗА ВИШНЕВСЬКИМ							42
МАЗЬ БАКТЕРИЦИДНО-АКАРИЦИДНА «ЯМ»							43
МАЗЬ ІХТІОЛОВА							44
МАЗЬ ОКСИТЕТРАЦИКЛІНОВА 1%							45
МАЗЬ ЦИНКОВА 10%							46
ПРИСИПКА ДЛЯ ІНФІКОВАНИХ РАН							47

ВЕТЕРИНАРНІ ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ

ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА РІДКА ІНАКТИВОВАНА ДЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ ТВАРИН РАБІСТАР РЕД (RABISTAR RED)			48
ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ М'ЯСОЇДНИХ ТВАРИН «ОРІСВАК»			50

ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА ДЕРАТИЗАЦІЇ

ХЛОРСЕПТ							51
БИОЦИД САНДЕЗ							53
СТОП ГРИЗУН							55

ДІАГНОСТИЧНІ НАБОРИ

НАБІР ДІАГНОСТИЧНИЙ «АЧС ПЛР-РЧ»				●			56
НАБІР ДІАГНОСТИЧНИЙ «АЧС/КЧС ДУО ПЛР-РЧ»				●			57
НАБІР ДІАГНОСТИЧНИЙ «CAPRIPOXVIRUS ПЛР-РЧ»	●						58

ШВЕЙНІ ВИРОБИ

Скоро будуть Новинки!

Піноцефур ФОРТЕ



Таблетки для внутрішньоматкового застосування



цефтіофур (в формі цефтіофур гідрохлориду) – 500 мг
пропранолол гідрохлорид – 100 мг



Цифлувет



Розчин з інсектицидною дією для зовнішнього застосування



цифлутрин – 10 мг



Гентацеф ФОРТЕ



Суспензія для інтрацестерального застосування



цефалексин – 200 мг, гентаміцину сульфат – 100 мг
дексаметазон фосфат – 0,75 мг, вітамін А – 10 000 МО



Тримесул 48%



Суспензія для перорального застосування



триметоприм – 80,0 мг
сульфадіазин – 400 мг



Пермаммас ВЕТ



Емульсія для догляду за вименем



метилсаліцилат- 2,5 мг
камфора- 10,0 мг
ментол- 2,5 мг
гваякол- 5,0 мг



Мастисепт АКТИВ



Мазь для догляду за вименем



камфора – 50 мг, скипидар живичний – 50 мг,
ментол – 20 мг, метилсаліцилат – 20 мг,
новокаїн – 1 мг, преднізолон – 1 мг, тимол – 1 мг.



Лекасепт



Мазь для догляду за вименем



олія евкаліптова – 3,5 г; олія розмаринова – 0,4 г;
олія з листя лавру – 1,5 г; камфора – 0,2 г;
ментол – 0,1 г; хлорофіл – 0,023 г.



Ветабіцин-3

(порошок для суспензії для ін'єкцій)

бензилпеніциліну новокаїнова сіль -
200 000 ОД
бензилпеніциліну натрієва сіль -
200 000 ОД
бензилпеніциліну бензатин -
200 000 ОД



Лікування ВРХ, хворої на некробактеріоз, пастерельоз, пневмонію, мастит, метрит, ранову інфекцію, отит, флегмону, стрептококову септицемію, емфізематозний карбункул. Лікування коней, хворих на некробактеріоз, пастерельоз, пневмонію, мастит, метрит, ранову інфекцію, отит, септицемію, флегмону, актиномікоз, стрептококову септицемію, мит, стахіботріотоксикоз. Лікування свиней, хворих на некробактеріоз, пастерельоз, пневмонію, ранову інфекцію, отит, стрептококовий, стафілококовий, бешиху. А також при захворюваннях органів сечостатевої системи.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Спектр антимікробної дії препарату аналогічний спектру дії бензилпеніциліну. До препарату чутливі грампозитивні (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* (крім *S. faecalis*), *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium diphtheriae*), грамнегативні (*Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*) мікроорганізми, спірохети (*Treponema spp.*, *Borrelia spp.*, *Leptospira spp.*).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Суспензію препарату готують, дотримуючись правил асептики, безпосередньо перед введенням. Після додавання 9 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або стерильної води для ін'єкцій, або 0,25–0,5 % розчину новокаїну флакон необхідно струсити до отримання рівномірної суміші. Препарат вводять внутрішньом'язово один раз на 7 діб у дозах:

Вид тварин	Разова доза тис. ОД на 1 кг маси тіла тварини	
	Дорослі тварини	Молодняк
ВРХ	10	15
Свині	10	20
Коні	10	12

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо людям дозволяється через 16 діб після останнього застосування препарату.

ФОРМА ВИПУСКУ

Скляні флакони, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 600 000 ОД.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 20°C. Термін придатності - 3 роки.

АНТИБІОТИКИ ТА ПРОТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ

Бетабіцин-5

(порошок для суспензії для ін'єкцій)



бензилпеніциліну новокаїнова сіль -
300 000 ОД
бензилпеніциліну бензатин -
1 200 000 ОД

Лікування великої рогатої худоби, хворої на некробактеріоз, пастерельоз, пневмонію, мастит, метрит, ранову інфекцію, отит, флегмону, стрептококову септицемію, емфізематозний карбункул. Лікування коней, хворих на некробактеріоз, пастерельоз, пневмонію, мастит, метрит, ранову інфекцію, отит, септицемію, флегмону, актиномікоз, стрептококову септицемію, мит, стахіботріотоксикоз. Лікування свиней, хворих на некробактеріоз, пастерельоз, пневмонію, ранову інфекцію, отит, стрептококоз, стафілококоз, бешиху.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Бензилпеніцилін активний щодо грампозитивних бактерій, таких як: *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Bacillus spp.* (з меншою мірою по відношенню до *Enterococcus spp.*), лістерій (*L. monocytogenes*), збудника бешихи свиней (*E. rhusiopathie*), більшості корінобактерій, більшості анаеробних бактерій (*Peptostreptococcus spp.*, *Clostridium spp.*), спірохет (*Treponema spp.*, *Borrelia spp.*, *Leptospira spp.*), актиноміцетів. З грамнегативних бактерій до бензилпеніциліну чутливі *Neisseria spp.*, *P. multocida*, *H. dugreyi*.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Суспензію препарату готують, дотримуючись правил асептики, безпосередньо перед введенням. Після додавання 9 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або стерильної води для ін'єкцій, або 0,25–0,5 % розчину новокаїну флакон необхідно струсити до отримання рівномірної суміші. Препарат вводять внутрішньом'язово один раз на 10–15 діб у дозах:

Вид тварин	Разова доза тис. ОД на 1 кг маси тіла тварини	
	Дорослі тварини	Молодняк
ВРХ	10	15
Свині	10	20
Коні	10	12

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 18 діб після останнього застосування препарату.

ФОРМА ВИПУСКУ

Скляні флакони, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 1 500 000 ОД.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 20°C.
Термін придатності - 3 роки.

Бетадокс

(порошок для перорального застосування)

доксцикліну гіклат — 50 мг
тилозину тартрат — 50 мг
кислота аскорбінова — 100 мг



Лікування свиней, телят (віком до 3 місяців), хворих на септицемію, а також при захворюваннях органів дихання (бронхопневмонія, ензоотична пневмонія, атрофічний риніт та інші), травного каналу (колібацильоз, сальмонельоз), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до доксицикліну та тилозину. Лікування курей (бройлерів, племінних курей, ремонтного молодняку), хворих на колибацильоз, сальмонельоз, хламідіоз, септицемію, а також при захворюваннях органів дихання.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Доксициклін - бактериостатичний антибіотик, що належить до групи тетрациклінів. Механізм дії полягає в порушенні зв'язку аміноацил-тРНК з 30S рибосомальною субодиницею, що призводить до інгібування синтезу білків у мікробній клітині. Препарат володіє широким спектром антимікробної дії проти грампозитивних та грамнегативних бактерій (*Staphylococcus spp.*, *Diplococcus pneumoniae*, *Streptococcus spp.*, *Haemophilus influenza*, *E. coli*, *Pneumococci spp.*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium tetani*, *Clostridium perfringens*, *Listeria monocytogens*, *Actinomyces spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Yersinia spp.*), а також мікоплазм (*Mycoplasma spp.*), рикетсій (*Rickettsia spp.*) та хламідій (*Chlamydia spp.*).

Тилозин – антибіотик групи макролідів, активний щодо грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Diplococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Neisseria spp.*, *Bacteriodes nodosus*, *Moraxella bovis*, *Pasteurella spp.*, *Spirocheta spp.*). Особливо чутливі до тилозину мікоплазми (*Mycoplasma gallisepticum*, *M. hyopneumoniae*, *M. synoviae*, *M. meleagridis*, *M. agalactiae*, *M. bovis genitalium*), а також хламідії (*Chlamydia spp.*) та рикетсії (*Rickettsia spp.*). Механізм дії тилозину полягає в блокуванні синтезу білка у бактеріальній клітині шляхом утворення комплексу з 50S-субодиницями рибосом.

Аскорбінова кислота має важливе значення для життєдіяльності організму. Бере участь у регуляції окисно-відновних процесів, вуглеводного обміну, згортанні крові, нормальному проникненні капілярів, синтезу стероїдних гормонів, синтезу колагену і проколагену. Підвищує стійкість організму до інфекцій.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Перорально з питною водою у дозах:

телята (до 3 місяців) — 1 г на 10 кг маси тіла двічі на добу протягом 3-5 діб;

свині, кури (бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк) — 20 г препарату на 10 л питної води протягом 3-5 діб.

АНТИБІОТИКИ ТА ПРОТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати курям–несучкам, яйця яких використовують для споживання людям, а також жуйним тваринам із функціонально розвиненими передшлунками.

Не призначати тваринам із порушенням функції печінки та нирок.

Не застосовувати одночасно із пеніцилінами, цефалоспоринами, хінолонами та лінкоміцином, а також із нестероїдними протизапальними засобами.

Не застосовувати свиноматкам у період вагітності (2-3 триместр).

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють через 7 діб (свійська птиця), 8 діб (свині) та 14 діб (телята) після останнього застосування препарату.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 10, 50, 100, 200, 500 та 1000 г.

Поліетиленові пакети по 10, 50, 100, 200, 500 та 1000 г.

Полімерні контейнери по 100, 200, 500 та 1000 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності -2 роки.

Термін придатності після розведення у питній воді - 24 години.

Ветасептол

(порошок для перорального застосування)



окситетрацикліну гідрохлорид — 3,5 г
еритроміцин — 1,5 г

Лікування телят (віком до 3-х місяців), поросят, свиней, собак, котів, норок, свійської птиці (бройлерів, гусей), хворих на метрит, мікоплазмоз, а також при захворюваннях травного каналу, органів дихання і сечостатевої системи, інфікованих ранах, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до окситетрацикліну та еритроміцину.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Поєднання антибіотиків еритроміцину та окситетрацикліну підвищує ефективність, зменшує побічну дію і гальмує утворення резистентних штамів. Механізм антибактеріальної дії Ветасептолу полягає в гальмуванні синтезу білків бактерійних клітин, що розмножуються. **Окситетрациклін** – має широкий спектр дії до грампозитивних і грамнегативних бактерій (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Brucella spp.*, *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Klebsiella spp.*), а також спірохет (*Spirochaeta spp.*), рикетсій (*Rickettsia spp.*), мікоплазм (*Mycoplasma spp.*) і хламідій (*Chlamydia spp.*). **Еритроміцин** — активний по відношенню до грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus influenzae*, *Bordetella pertussis*, *Legionella spp.*), а також бруцелл (*Brucella spp.*), рикетсій (*Rickettsia spp.*), мікоплазм (*Mycoplasma spp.*) і хламідій (*Chlamydia spp.*).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Перорально, індивідуально або груповим методом з кормом двічі на добу, протягом 5 діб у наступних дозах: телята, віком до 3 місяців — 3 г препарату на 10 кг маси тіла; свині — 3 г препарату на 10 кг маси тіла; свійська птиця (кури-бройлери) — 1 г препарату на 1 кг маси тіла. Препарат задають відразу після змішування з кормом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не випоювати з молоком.

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 11 діб після останнього застосування препарату.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 10, 50, 100, 200 та 500 г.

Поліетиленові пакети по 10, 50, 100, 200 та 500 г.

Паперові мішки з поліетиленовою вставкою по 8, 10, 15 та 20 кг.

Паперові мішки по 8, 10, 15 та 20 кг.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності — 2 роки.

АНТИБІОТИКИ ТА ПРОТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ

Ветпеніцилін

(порошок для суспензії для ін'єкцій)



бензилпеніциліну натрієва сіль —
1 000 000 ОД



Лікування ВРХ, овець, кіз, коней, свиней, собак, норок, нутрій, кролів, хворих на некробактеріоз, сибірку, пастерельоз, пневмонію, мастит, метрит, ранову інфекцію, отит, інфекції сечовивідних шляхів, септицемію, флегмону; емфізематозний карбункул; стрептококову септицемію великої рогатої худоби, овець та кіз; мит коней, стрептококоз, стафілококоз, інфекційний стоматит, риніт, бешиху свиней, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до бензилпеніциліну.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Бензилпеніцилін є бактерицидним антибіотиком, що належить до групи пеніцилінів. Бензилпеніцилін інгібує синтез пептидоглікану клітинної оболонки, що призводить до лізису клітин, які діляться. Бензилпеніцилін активний щодо грампозитивних мікроорганізмів (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., крім *Enterococcus faecalis*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium diphtheriae*), грамнегативних мікроорганізмів (*Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*), *Treponema pallidum*. До дії препарату стійкі більшість грамнегативних бактерій, мікобактерії, гриби, віруси, *Rickettsia* spp., *Entamoeba histolytica*.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Суспензію препарату готують дотримуючись правил асептики, безпосередньо перед введенням. Суспензію препарату готують шляхом розчинення препарату 2-5 мл стерильного ізотонічного розчину натрію хлориду або дистильованої води або 0,25-1%-ного розчину новокаїну. Розчини нагрівати заборонено. Вводять внутрішньом'язово 3-4 рази на добу. Дози для тварин: коні — 2-3 тис. ОД на 1 кг м.т.; ВРХ — 3-5 тис. ОД на 1 кг м.т.; вівці, кози — 4-10 тис. ОД на 1 кг м.т.; свині — 6-8 тис. ОД на 1 кг м.т.; пушні звірі та собаки — 10-20 тис. ОД на 1 кг м.т.; кролики — 6-10 тис. ОД на 1 кг м.т.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб після останнього застосування препарату. Споживання молока дозволяють через 3 доби.

ФОРМА ВИПУСКУ

Скляні флакони, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 1 000 000 ОД.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 20 °С. Термін придатності -3 роки.

Ветстрептоміцину сульфат

(порошок для суспензії для ін'єкцій)



стрептоміцину сульфат — 1 000 000 ОД

Лікування свиней, хворих на лептоспіроз, набрякову хворобу, бешиху свиней, респіраторні захворювання, раневий сепсис, а також первинні та вторинні інфекції, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до стрептоміцину.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Стрептоміцин — антибіотик аміноглікозидної групи, який продукується *Streptomyces globisporus streptomycini*. Стрептоміцин має виражену бактерицидну дію на грамнегативні мікроорганізми і спірохети, в т.ч. *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Shigella spp.*, *Hemophilus spp.*, *Brucella spp.*, *Leptospira* штамів Pomona, Grippothiphosa, Canicola, Tarrassovi, Icterohaemorrhagiae. Він активний відносно мікобактерій, *Francisella tularensis* і *Yersinia pestis*, деяких мікоплазм.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Безпосередньо перед застосуванням препарат розчиняють в 5 мл стерильної води або ізотонічного розчину хлориду натрію. Розчин препарату вводять внутрішньом'язово, глибоко в м'яз. Препарат вводять в дозі 10 000 ОД на 1 кг маси тіла тварини, двічі на добу з інтервалом 12 годин, протягом 5 діб. При лептоспірозі препарат вводять протягом 4-7 діб у дозі 10 000 – 12 000 ОД на 1 кг маси тіла тварини.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 22 доби після останнього застосування препарату.

ФОРМА ВИПУСКУ

Скляні флакони, закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 0,25, 0,5, 1,3 та 5,0 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 до 25 °С.
Термін придатності – 3 роки.

АНТИБІОТИКИ ТА ПРОТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ

Колістовет

(порошок для перорального застосування)



колістину сульфат – 10 000 000 МО



Лікування свиней і свійської птиці (курей-бройлерів, курчат, родинних пар, ремонтного молодняку, індиків) при захворюваннях травного каналу (колібактеріоз, сальмонельоз тощо), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до колістину.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Колістин - антибіотик групи поліміксинів, які синтезуються аеробною спороутворюючою паличкою *Bacillus polymyxa*. Препарат діє бактерицидно на грамнегативні бактерії (*E.coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*).

Колістин зв'язується з фосфоліпідами цитоплазматичної мембрани, посилює її проникливість як для внутрішніх, так і для зовнішньоклітинних компонентів, спричиняючи деструкцію бактеріальної клітини. Крім цього колістин зв'язує фосфоліпід А і нейтралізує біологічний ефект бактеріального ендотоксину.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Перорально з кормом або питною водою протягом 5-7 діб у дозах:

свині – 1 г препарату на 100 кг маси тіла або 200 г препарату на 1 тону корму на добу;
свійська птиця (кури-бройлери, курчата, родинні пари, ремонтний молодняк, індики) – 7,5 мг препарату на 1 кг маси тіла або 100-150 г препарату на 1 тону корму або 1000 л питної води.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють через 3 доби після останнього застосування препарату. Споживання яєць дозволяють без обмежень.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 10, 50, 100, 200, 500 та 1000 г.

Полімерна тара по 10, 50, 100, 200, 500 та 1000 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 до 25 °С.

Термін придатності — 2 роки.

Термін придатності після розчинення у питній воді – 24 години.

Термін придатності після змішування з кормом - 5 діб.

Мепатар

(порошок для перорального застосування)



окситетрацикліну гідрохлорид - 5,0 г

Лікування телят віком до 3-х місяців, свиней, свійської птиці (курей-бройлерів, курчат, гусей, індиків) при захворюваннях травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до окситетрацикліну.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Окситетрациклін є бактеріостатичним антибіотиком, який діє на рибосоми бактерій, перешкоджаючи білковому синтезу. Препарат має широкий спектр антимікробної дії проти грампозитивних та грамнегативних бактерій (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Brucella spp.*, *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Klebsiella spp.*), а також актиноміцети (*Actinomycetes spp.*), протозойні (*Protozoa spp.*), спірохети (*Spirochaeta spp.*), рикетсії (*Rickettsia spp.*), мікоплазми (*Mycoplasma spp.*) і хламідії (*Chlamydia spp.*).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Препарат задають з кормом або питною водою. Курс лікування — 5-7 днів. Перорально двічі на добу в дозах:

Вид тварин	Добова доза
Свині, поросята	4 г препарату на 10 кг маси тіла
Телята	4 г препарату на 10 кг маси тіла
Птиця (кури, гуси, індики)	0,4–1,0 г препарату на 1 кг маси тіла

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати курам–несучкам, яйця яких використовують для споживання людям. Забій тварин на м'ясо дозволяють через 7 днів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 10, 50, 100, 200, 250 та 500 г.
Поліетиленові пакети 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 та 500 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С.
Термін придатності - 2 роки.

АНТИБІОТИКИ ТА ПРОТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ

Ніфулін

(порошок для перорального застосування)



метронідазол — 11 г
фуразолідон — 6,5 г
окситетрацикліну гідрохлорид — 2,5 г

Лікування собак та котів при захворюваннях травного каналу, що спричинені бактеріями та найпростішими, чутливими до окситетрацикліну, метронідазолу та фуразолідону. Хутрові звірі (норки, песці): лікування тварин, хворих на еймеріоз, а також при захворюваннях травного каналу. Голуби: лікування птиці, хворої на гістомоноз, еймеріоз, сальмонельоз, трихомоноз.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Ефективний проти найпростіших (*Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Giardia intestinalis*, *Entamoeba histolytica*), облигатних анаеробних бактерій (*Bacteroides fragilis*, *Bacteroides distasonis*, *Bacteroides ovatus*, *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Bacteroides vulgatus*), *Fusobacterium spp.*, *Veillonella spp.*), деяких грампозитивних бактерій (*Eubacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Peptococcus spp.*, *Peptostreptococcus spp.*). Проти *Giardia*, *Vibrio cholerae*, *Trichomonas*, *Coccidia*, а також *E. coli*, *Enterobacter spp.*, *Campilobacter spp.*, *Salmonella spp.* Препарат володіє широким спектром дії на грампозитивні та грамнегативні мікроорганізми: *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Brucella spp.*, *Haemophilus spp.*, *E. coli*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Erysipelothrix spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Salmonella spp.*, а також на найпростіші (Protozoa), мікоплазми (*Mycoplasma spp.*), рикетсії (*Rickettsia spp.*) та хламідії (*Chlamydia spp.*).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Перорально у дозах:

собаки, коти – 0,1–0,2 г препарату на 1 кг маси тіла 3 рази на добу з кормом, протягом 7–10 діб;
хутрові звірі (песці, норки) – 0,2–0,3 г препарату на 1 кг маси тіла 3 рази на добу з кормом, протягом 3 доби; голуби – по 3 г препарату на 1 кг корму щодобово протягом 7–10 діб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При необхідності курс лікування повторюють лише після 10-денної перерви.
Препарат несумісний з ефедрином гідрохлоридом, фенаміном.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 10, 50, 100 г.
Поліетиленові пакети по 10, 50, 100 г.
Полімерні контейнери по 100 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце за температури від 2 до 20 °С.
Термін придатності — 2 роки.

Сульфатилозин

(порошок для перорального застосування)

сульфадимідин — 17,5 г

триметоприм — 3,5 г

тилозину тартрат — 3,0 г

окситетрацикліну гідрохлорид — 5,0 г



Лікування ВРХ (віком до 3-х місяців), коней, кіз та овець (віком до 3-х місяців), свиней, собак, котів, кролів, курей (курчата, бройлери, ремонтний молодняк), гусей качок, індиків, хворих на цистит, мастит, септицемію, колибактеріоз, пастерельоз, лептоспіроз, мікоплазмоз, вібірїоз, дизентерію, бешиху свиней, набрякову хворобу, а також при післяпологових ускладненнях.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Компоненти, які входять до складу препарату, обумовлюють його широкий спектр антибактеріальної активності по відношенню до грампозитивних (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*) і грамнегативних бактерій (*E. coli*, *Bordetella spp.*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasterella spp.*, *Proteus spp.*, *Campylobacter spp.*), а також актиноміцетів, лептоспір, мікоплазм (*Mycoplasma spp.*), рикетсій (*Rickettsia spp.*), спірохет (*Spirochetes*). Комплексний препарат має широкий спектр бактерицидної та бактериостатичної дії, в тому числі проти мікроорганізмів, резистентних до окремих антибіотиків та хіміотерапевтичних препаратів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Перорально з кормом або з питною водою чи молоком двічі на добу в дозі 1,3-1,5 г препарату на 10 кг маси тіла з інтервалом у 12 годин, протягом 5-7 діб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забороняють застосовувати курям-несучкам, яйця яких призначені для споживання в їжу людям, а також дійним коровам, молоко яких призначене для споживання людьми. Забій тварин і птиці на м'ясо дозволяють через 10 діб після останнього застосування препарату.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 10, 50, 100, 200, 500 г.

Полімерна тара по 10, 50, 100, 200, 500 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 до 25°C.
Термін придатності — 2 роки.

ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ПРЕПАРАТИ

Альбендазол 10%

(порошок для перорального застосування)



альбендазол — 10 г

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, м'ясоїдних, птиці при інвазійних захворюваннях, спричинюваних різноманітними паразитами.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Антигельмінтний засіб широкого спектру дії, належить до групи бензimidазолів, гальмує синтез фумаратредуктази в організмі гельмінтів, що в свою чергу впливає на цикл Кребса і викликає зменшення синтезу глікогену, та на енергетичний метаболізм. Ці зміни зумовлюють загибель паразита внаслідок виснаження. Ефективний проти дорослих та личинкових форм нематод травного тракту та легень, а також проти цестод та трематод.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Препарат вводиться перорально, одноразово з кормом.

Вид	Клас гельмінтів	Доза, г/10 кг		Нематоди	1,0
	Нематоди	0,75		Нематоди	2,5
	Цестоди	0,75		Цестоди	2,5
	Трематоди	1,0		Трематоди	2,5
	Нематоди	0,5		Нематоди	1,0
	Цестоди	0,5			
	Трематоди	0,75			

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 14 діб, а молоко можна використовувати в їжу людям через 5 діб після останнього застосування препарату.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 10, 100, 200, 500, 1000 г.
Поліетиленові пакети по 10, 100, 200, 500, 1000 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, місце за температури від 15 до 20 °С.
Термін придатності – 2 роки.

Бетазурил

(розчин для перорального застосування)



толтразурил — 25 мг

Лікування курей (бройлерів, ремонтного молодняку курей), індиків, гусей, качок при еймеріозах, спричинюваних такими видами еймерій:

- у курей (бройлерів, ремонтного молодняка): *Eimeria acervulina*, *E. brunette*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*;
- у індиків: *Eimeria adenoides*, *E. meleagridis*, *E. meleagrimits*;
- у гусей, качок: *Eimeria anseris*, *E. truncate*.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Антипротозойний засіб для профілактики та лікування еймеріозу птиці.

Толтразурил – це синтетична речовина з групи триазинтріону з високим ступенем безпеки. Має еймеріоцидну дію на всі внутрішньоклітинні стадії розвитку еймерій в епітеліальних клітинах кишечника (ендогенний цикл розвитку: мерогонія, гаметогонія). Ефективний проти усіх видів еймерій. Сумісний з вітамінами, кормовими добавками та лікарськими засобами для птиці.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Препарат застосовують перорально з питною водою у дозі:

1 мл на 1 л питної води впродовж 48 годин або 3 мл на 1 л питної води впродовж 8 годин.

Розчин з препаратом використовують як єдине джерело питної води.

При тяжких випадках еймеріозу лікування повторюють через 5 днів.

Розчинений у питній воді препарат використовують протягом 24 годин.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій птиці на м'ясо дозволяють через 8 днів після останньої обробки препаратом. Під час лікування дотримуватись чистоти в приміщеннях та контролювати вологість повітря. Необхідно лікувати усе поголів'я птиці одночасно. Для досягнення ефективного лікування препарат необхідно застосовувати до виникнення клінічних ознак захворювання.

ФОРМА ВИПУСКУ

Полімерні або скляні флакони по 10, 50, 100, 200, 500, 1000 мл.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності 2 роки.

Термін придатності після першого відкриття 3 місяці.

ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ПРЕПАРАТИ

Мебендазол 10%

(порошок для перорального застосування)



мебендазол — 10 г



Лікування тварин при нематодозах ШКТ та легень.
ВРХ, вівці, кози: *Haemonchus* spp., *Nematodirus* spp., *Trichocephalus* spp., *Strongyloides* spp., *Protostrongyloides* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Chabertia* spp., *Muellerius* spp. Коні: *Parascaris equorum*, *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Triodontophorus* spp. Свині: *Ascaris suum*, *Oesophagostomum* spp., *Trichocephalus* spp., *Strongyloides* spp., *Metastrongylus* spp. М'ясоїдні: *Toxocara* spp., *Toxascaris* spp., *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris* spp. Птиця: аскаридіоз - *Ascaridia galli*; сингамоз - *Syngamus trachea*.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Протипаразитарний препарат, впливає на енергетичний метаболізм паразитів. Діюча речовина мебендазол гальмує синтез фумаратредуктази, що впливає на цикл Кребса і викликає уповільнення синтезу глікогену. Ці зміни зумовлюють загибель паразита внаслідок виснаження. Ефективний проти дорослих та личинкових форм шлунково-кишкових та легневих нематод.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Препарат застосовують з невеликою кількістю корму, одноразово, зранку.

Вид тварин	Дози	Вид тварин	Дози
Коні	6–8 г на 100 кг м.т.	ВРХ	8–10 г на 100 кг м.т.
Вівці	1 г на 10 кг м.т.	Свині	2 г на 10 кг м.т.
Собаки	6–8 г на 10 кг м.т.	Фазани, гуси	1 г на 1 кг м.т.
Кури при сингамозі	1 г на 1 кг м.т.	Кури при аскаридіозі	0,4 г на 1 кг м.т.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не рекомендується застосовувати препарат коровам у перші 45 днів тільності.
Забій тварин на м'ясо дозволяється через 14 діб, а молоко використовувати в їжу людям через 6 діб після застосування препарату тваринам.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 10, 50, 100, 200, 500 г.
Поліетиленові пакети по 10, 50, 100, 200, 500 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У захищеному від світла місці за температур від 15 до 20 °С.
Термін придатності 2 роки.

Феборал

(розчин для перорального застосування)



фенбендазол - 10 г



Профілактика та лікування ВРХ, овець, кіз, коней, свиней, птиці при інвазійних захворюваннях.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Препарат володіє антигельмінтними властивостями широкого спектру дії. Фенбендазол, діюча речовина, належить до групи бензімідазолів. Ефективний щодо статевозрілих форм личинок і яєць нематод шлунково-кишкового тракту і легень; проти деяких родин цестод та трематод. Фенбендазол гальмує полімеризацію білків тубулінів в мікротубуліни, знижує активність енергетичних процесів (АТФ та глюкози), що викликає параліч м'язів та призводить до загибелі паразитів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат застосовують при на наступних захворюваннях викликаних такими збудниками:

Вид тварин	Хвороба	Збудник
ВРХ, вівці, кози	нематоди	
	гемонхоз	<i>Haemonchus contortus</i> , <i>H. placei</i> , <i>H. similis</i>
	буностомоз	<i>Bunostomum trigonocephalum</i> , <i>B. phlebotomum</i>
	хабертіоз	<i>Chabertia ovina</i>
	стронгілоїдоз	<i>Strongyloides papillosus</i>
	диктиокаульоз	<i>Dictyoaulus filaria</i> , <i>D. viviparus</i>
	неоаскароз	<i>Neoascaris vitulorum</i>
	протостронгілоз	<i>Protostrongylus kochi</i> , <i>Miellerius capillaris</i>
	трематоди	
	парамфістоматоз	<i>Paramphistomum ichikawai</i> , <i>Liorchis scotiae</i>
	дикроцеліоз	<i>Dicrocoelium dendriticum</i>
	цестоди	
	монієзіоз	<i>Moniezia expansa</i> , <i>M. benedeni</i>
	ехінококоз	<i>Echinococcus granulosus</i>
	тизанієзіоз	<i>Thysaniezia giardi</i>

ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ПРЕПАРАТИ

Коні	нематоди	
	стронгілідоз	<i>Strongylus equinus, S.vulgaris, S.edentatus</i>
	параскароз	<i>Parascaris equorum</i>
Свині	нематоди	
	стронгілідоз	<i>Strongyloides ransomi</i>
	езофагостомоз	<i>Oesophagostomum dentatum</i>
	аскароз	<i>Ascaris suum</i>
	метастронгілез	<i>Metastrongylus spp.</i>
	цестоди	
	ехінококоз	<i>Echinococcus granulosus</i>
Птиця (кури, індики, качки, гуси)	нематоди	
	аскаридіоз	<i>Ascaridia galli</i>
	гетеракідоз	<i>Heterakis gallinarum</i>
	амідостомоз	<i>Amidostomum anseris</i>
	капімеріоз	<i>Capillaria anseris</i>
	сингамоз	<i>Sungamus trachea</i>
	тетрамероз	<i>Tetrameres fissispina</i>
	стрептокароз	<i>Streptocara crassicauda</i>

ДОЗИ

Перед застосуванням ретельно збовтати.
Препарат вводять перорально груповим або індивідуальним методом з питною водою у дозах:

Вид тварин, гельмінтози	Доза, мл/10 кг м.т.	Кратність обробок, інтервал
ВРХ	1,0	одноразово
диктіокаульоз, неоаскароз, стронгілідоз		
дикроцеліоз	3,3	одноразово
цистицеркоз	2,5	3, щодоби
парамфістоматози	0,75	5, щодоби
Вівці та кози	0,5	одноразово
неоаскароз, протостронгілidoзи, трихостронгілidoзи, стронгілідоз		
диктіокаульоз, монієзіоз, тизанієзіоз	1,0	одноразово
ларвальні цестодози: ехінококоз, ценуроз	4,0	3, щодоби
дикроцеліоз	2,0	2, щодоби
Свині	1,0	2, через 12 годин
аскароз, метастронгілез, трихуроз		
стронгілідоз, езофагостомоз	0,5	2, через 12 годин

ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ПРЕПАРАТИ

Профілактика (змішана інвазія)		
поросята з 2-х до 10 тижневого віку	0,01	один раз, щотижня
молодняк на відгодівлі до 9 місяців	0,5	один раз, щомісяця
ехінококоз	2,0	5, щодоби
Коні параскароз	1,5	одноразово
кишкові стронгілятози	1,0	одноразово
стронгілоїдоз (лошата)	0,8	2, щодоби
Птиця (кури, індики, качки, гуси) аскаридіоз, гетеракідоз птиці, капіляріоз, амідостомоз, сингамоз, тетрамероз, стрептокароз	1,0	2, щодоби

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій на м'ясо дозволяється: птиця через 3 доби; всі інші тварини через 10 діб.
Використовувати молоко в їжу людям дозволяється через 2 доби після останньої обробки тварин препаратом.

ФОРМА ВИПУСКУ

Полімерні флакони по 50, 100, 200, 500, 1000 мл.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25° С.
Термін придатності 2 роки.

ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ПРЕПАРАТИ

Федазол 22

(порошок для перорального застосування)



фенбендазол — 22 г



Профілактика та лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, собак, котів, кролів, птиці при інвазійних захворюваннях.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Антигельмінтний засіб широкого спектру дії. Фенбендазол, діюча речовина, належить до групи бензімідазолів. Він ефективний щодо статевозрілих форм личинок і яєць нематод шлунково-кишкового тракту і легень; проти деяких родин цестод та трематод. Фенбендазол гальмує полімеризацію білків тубулінів в мікротубуліни, знижує активність енергетичних процесів (АТФ та глюкози), що викликає параліч м'язів та призводить до загибелі паразитів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вид тварин	Хвороба	Збудник
ВРХ, вівці, кози	нематоди	
	гемонхоз	<i>Haemonchus contortus</i> , <i>H.placei</i> , <i>H.similis</i>
	буностомоз	<i>Bunostomum trigonocephalum</i> , <i>B.phlebotomum</i>
	хабертіоз	<i>Chabertia ovina</i>
	стронгілоїдоз	<i>Strongyloides papillosus</i>
	диктіокаульоз	<i>Dictiocaulus filaria</i> , <i>D.viviparus</i>
	неоаскароз	<i>Neoscaris vitulorum</i>
	телязіоз	<i>Thelazia rhodesi</i> , <i>T.gulosa</i> , <i>T.skrjabini</i>
	протостронгілоз	<i>Protostrongylus kochi</i> , <i>Miellerius capillaris</i>
	трематоди	
	парамфістоматоз	<i>Paramphistomum ichikawai</i> , <i>Liorchis scotiae</i>
	дикроцеліоз	<i>Dicrocoelium dendriticum</i>
	цестоди	
	монієзіоз	<i>Moniezia expansa</i> , <i>M.benedeni</i>
	ехінококоз	<i>Echinococcus granulosus</i>
	тизанієзіоз	<i>Thysaniezia giardi</i>

ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ПРЕПАРАТИ

Коні	нематоди	
	стронгілідоз	Strongylus equinus, S.vulgaris, S.edentatus
	параскароз	Parascaris equorum
Свині	нематоди	
	стронгілоїдоз	Strongyloides ransomi
	езофагостомоз	Oesophagostomum dentatum
	аскароз	Ascaris suum
	метастронгільоз	Metastrongylus spp.
	цестоди	
Собаки, коти	ехінококоз	Echinococcus granulosus
	нематоди	
	токсокароз	Toxocara spp.
	токсаскароз	Toxascaris spp.
	анкілостомоз	Ancylostoma caninum
	унцинаріоз	Uncinaria Stenocephala
	цестоди	
	дипілідіоз	Dipylidium caninum
	дифілоботріоз	Diphylobotrium latum
	ехінококоз	Echinococcus granulosus
Кролі	трематоди	
	опісторхоз	Opisthorchis felineus, O.viverrini, O.sinensis
	нематодіроз	Nematodirus spp.
Птиця (кури, індики, качки, гуси)	нематоди	
	аскаридїоз	Ascaridia galli
	гетеракідоз	Heterakis gallinarum
	амідостомоз	Amidostomum anseris
	капімеріоз	Capillaria anseris
	сингамоз	Sungamus trachea
	тетрамероз	Tetrameres fissispina
	стрептокароз	Streptocara crassicauda

ДОЗИ

Препарат вводять перорально в дозах:

Вид тварин Гельмінтоз, захворювання	Дози, г/10 кг (маси тіла)	Кількість обробок, інтервал
ВРХ диктіокаульоз, неоаскароз, стронгілятози, стронгілоїдоз, телязіоз	0,38	одноразово
дикроцеліоз	0,9	5, щодоби
цистицеркоз	1,15	3, щодоби
парамфістоматоз	0,7	5, щодоби

ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ПРЕПАРАТИ

Вівці та кози неоаскароз, протостронгілідоз, трихостронгілідоз, стронгілоїдоз	0,23	одноразово
диктиокаульоз, монієзійоз, тизанієзійоз	0,45	одноразово
ларвальні цестодози: ехінококоз, ценуроз	1,8	3, щодоби
дикроцеліоз	0,9	3, щодоби
Свині аскароз, метастронгільоз, трихуроз, стронгілоїдоз	0,45	2, через 12 годин
езофагостомоз	0,23	2, через 12 годин
профілактика (змішана інвазія)		
поросята з 2 до 10 тижневого віку	0,046	1 раз, щотижня
молодняк на відгодівлі	0,23	1 раз, щомісяця
ехінококоз	0,9	5, щодоби
Коні параскароз	0,7	одноразово
кишечні стронгілятози	0,45	одноразово
стронгілоїдоз (молодняк)	0,38	2, щодоби
Собаки, коти анкілостоматоз, теніоз, токсаскароз, токсакароз	1,8	3, через 12 годин
Кролі: змішана нематодозна інвазія	0,7	2, щодоби
Птиця (кури, індички, качки, гуси) аскаридіоз, гетеракідоз, капіляріоз, амідостомоз, сингамоз, тетрамероз, стрептокароз	0,45	4–5, щодоби

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій на м'ясо дозволяється: птиця через 3 доби; всі інші тварини через 10 діб.
Використовувати молоко в їжу людям дозволяється через 2 доби після останньої обробки тварин препаратом.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 100, 200, 250, 500, 1000 г;
Поліетиленова тара по 100, 200, 250, 500, 1000 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце за температури від 15 до 20° С.
Термін придатності - 2 роки.

ПРЕПАРАТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОБМІН РЕЧОВИН

Вітамін-АДЕвіт

(розчин для ін'єкцій)

вітамін А - 30 000 МО

вітамін D₃ - 40 000 МО

вітамін Е - 20,0 мг



Профілактика та лікування у тварин А- і D-гіповітамінізів, аліментарної і вторинної остеодистрофії, післяродової гіпокальцемії та гіпофосфатемії, перед- та післяродового залежування, аліментарної дистрофії, бронхіту і бронхопневмонії, затримання посліду, субінволюції матки, ендометриту, переломів кісток, дисплазії суглобів.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Дія препарату зумовлена властивостями вітамінів А, D₃ і Е, які входять до його складу. Препарат сприяє нормалізації обміну речовин в організмі, підвищує його резистентність, регулює мінеральний обмін, позитивно впливає на ріст, розвиток і продуктивність сільськогосподарських тварин та птиці.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Препарат вводять із профілактичною метою внутрішньом'язово або підшкірно 1 раз на 7 діб, з лікувальною метою — внутрішньом'язово 1 раз на 5 діб до одужання (5-8 введень), у подальшому (за необхідності) препарат вводять у профілактичних дозах. При застосуванні препарату раціони тварин мають бути збалансовані за кальцієм, фосфором і мікроелементами.

Дози препарату розраховані за вітаміном D₃:

Вид тварин	Доза профілактична на 7 діб, мл	Доза лікувальна на 5 діб, мл
Корови сухостійні (600 кг)	1,8-2,0	3,5-4,0
Корови дійні (600 кг)	3,0	5,0
Молодняк КРС (на 100 кг м.т.)	0,7-1,0	1,5-2,0
Бугаї-плідники (на 1 т маси тіла)	2,0-2,5	5,0-6,0
Кобили жеребні	1,0-1,2	2,0
Кобили лактуючі	1,5	2,3-2,5
Лошата 6-12 місяців	0,4-0,5	1,0-1,5
Свиноматки поросні	0,4-0,5	1,0-1,5
Свиноматки лактуючі	0,5-0,6	1,25-1,3
Поросята масою 30-40 кг	0,15-0,20	0,4-0,5

ПРЕПАРАТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОБМІН РЕЧОВИН

Вівцематки кітні	0,2	0,4-0,5
Вівцематки лактуючі	0,3	0,6-0,7
Ягнята 4-6 міс.	0,1	0,25
Кози	0,15	0,5
Кури	0,05	0,15
Гуси, індики	0,1	0,2

Для збагачення раціонів тварин вітаміном А необхідно додатково вводити його препарати з профілактичною метою один раз на 7 діб, з лікувальною метою один раз на 5 діб в наступних дозах (тис. МО):

- коровам, відповідно, 300-350 і 350-400;
- молодняку (на 100 кг) - 70-80 і 80-90;
- кобилам жеребним - 200 і 400;
- кобилам лактуючим - 250 і 550;
- лошатам - 50 і 100;
- свиноматкам порослим - 80 і 150;
- свиноматкам лактуючим - 120 і 150-200;
- поросят - 40 і 60-80;
- вівцематкам кітним - 25 і 70;
- вівцематкам лактуючим - 40 і 80;
- козам - 30 і 40;
- курам - 6,0 і 9,0;
- гусям та індікам - 15-20 і 30.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати при гіпервітамінозах!

Не застосовувати разом зі солями тривалентного заліза та препаратами йоду!

Не застосовувати при гострих та хронічних хворобах печінки та нирок!

Період виведення відсутній.

ФОРМА ВИПУСКУ

Скляні флакони, об'ємом 50, 100, 200 мл.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне місце за температури від 5 до 20 °С.

Термін придатності — 12 місяців.

Вітамін-Тетра

(розчин для ін'єкцій)

вітамін А - 50 000 МО
вітамін D₃ - 25 000 МО
вітамін Е - 20,0 мг
вітамін F - 5,0 мг



Лікування та профілактика у тварин та птиці D-гіповітамінозів (рахіту), аліментарної і вторинної остеодистрофії, післяродової гіпокальціємії та гіпофосфатемії, перед- та післяродового залежування, аліментарної дистрофії, бронхіту і бронхопневмонії, затримання посліду, субінволюції матки, ендометриту, переломів кісток, дисплазії суглобів.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Дія препарату зумовлена властивостями вітамінів А, D₃, Е, F, які входять до його складу. Препарат сприяє нормалізації обміну речовин в організмі, підвищує його резистентність, регулює мінеральний обмін, позитивно впливає на ріст, розвиток і продуктивність сільськогосподарських тварин та птиці.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Препарат вводять з профілактичною метою внутрішньом'язово або підшкірно 1 раз на 7-10 діб, з лікувальною метою — внутрішньом'язово один раз на п'ять діб до одужання (5-8 введень), у подальшому (за необхідності) препарат вводять у профілактичних дозах. При застосуванні препарату раціони тварин мають бути збалансовані за кальцієм, фосфором і мікроелементами. Дози препарату розраховані за вітаміном А та подані у таблиці:

Вид тварин	Доза профілактична, мл		Доза лікувальна, мл
	на 7 діб	на 10 діб	на 5 діб
Корови дійні (500 кг)	10–12	15	15
Корови сухостійні (500 кг)	7–8	10–12	10–12
Молодняк ВРХ (на 100 кг масы тела)	2–2,5	3–4	2,5–3
Кобили жеребні	5–6	8	8–10
Лошата 6-12 місяців	1,5–2	2,5–3	2,5–3
Свиноматки поросні	2,5–3	3–4	3–5
Свиноматки лактуючі	3–4	4–5	5–7
Поросята відлучені	0,3–0,4	0,5–0,7	1
Вівцематки кітні та підсисні	1–1,2	2	2–2,5
Кози	0,5–0,8	1–1,5	1,5–2
Ягнята і козенята	0,1–0,15	0,2	0,4–0,6
Кури	0,07–0,08	0,1–0,12	0,12–0,2

ПРЕПАРАТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОБМІН РЕЧОВИН

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати при гіпервітамінозах!

Не застосовувати разом зі солями тривалентного заліза та препаратами йоду!

Не застосовувати при гострих та хронічних хворобах печінки та нирок!

Період виведення відсутній.

ФОРМА ВИПУСКУ

Скляні флакони, об'ємом 10, 50, 100 і 200 мл.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне місце за температури від 5 до 20 °С.

Термін придатності — 12 місяців.

Тимпанол

(розчин для перорального застосування)

симетикон — 10 мл

кислота молочна — 3,5 мл

настойка чемериці — 3,0 мл

настойка полині — 2,5 мл



Лікування великої рогатої худоби, кіз, овець за гострого перебігу піннявої тимпанії рубця та лікування коней за гострого перебігу метеоризму кишечника.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Препарат, введений перорально тварині, перешкоджає газоутворенню у травному каналі, руйнує пухирці газу, що утворились у кормових масах, забезпечує швидке виведення їх з організму, має асептичну та румінаторну дію, посилює перистальтику, знижує тонус сфінктерів шлунку та передшлунків жуйних тварин.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Великій рогатій худобі, вівцям, козам препарат вводять перорально за допомогою гумової пляшки або безпосередньо у порожнину рубця стравохідним зондом. Можна вводити препарат у порожнину рубця шляхом проколювання черевної стінки троакаром або ін'єкційною голкою. Коням препарат вводять через стравохідний зонд.

Дози препарату:

• велика рогата худоба, коні

4–5 мл препарату на 10 кг маси тіла;

• вівці, кози

5–10 мл препарату на 10 кг маси тіла.

Перед застосуванням препарат розводять водою у співвідношенні 1:10 (1 частина препарату на 10 частин питної води) або 1:15 (1 частина препарату на 15 частин питної води).

Якщо симптоми не зникають протягом 15–20 хв. після застосування препарату, тоді повторно вводять тварині у розведенні 1:5 (1 частина препарату на 5 частин питної води).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не застосовувати ослабленим, виснаженим тваринам, іншим видам тварин!

Не застосовувати одночасно з іншими румінаторними засобами!

ФОРМА ВИПУСКУ

Флакони скляні, об'ємом 100 і 200 мл, пляшки скляні та полімерні, об'ємом 250, 330, 500, 1000 і 2500 мл.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 0 до 20 °С.
Термін придатності 1 рік.

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ

Ветапірин

(суспензія для внутрішньоматкового застосування)



цефепірину бензатин — 500 мг

Лікування корів, хворих на підгострі та хронічні ендометрити (не раніше чим через 14 діб після отелення), які спричинені чутливими до цефепірину мікроорганізмами.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Цефепірин, що входить до складу препарату, відноситься до антибіотиків групи цефалоспоринів і володіє широким спектром дії проти грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus pyogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Salmonella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.* и др.).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Внутрішньоматково за допомогою одноразового катетера вводять 19 г препарату (вміст однієї шприц-туби) одноразово. Для цього з'єднують шприц-тубу з катетером, на руку надягають поліетиленову одноразову рукавичку, захоплюють шийку матки рукою, фіксують через пряму кишку, обережно вводять катетер зі шприцом через шийку матки в порожнину матки та витискають вміст поршнем. У разі потреби процедуру повторюють через 48 годин в тій же дозі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 1 добу після останнього введення препарату. Для молока період виведення становить 0 діб.
Не застосовувати вагітним тваринам.

ФОРМА ВИПУСКУ

Полімерні шприц-туби по 19 г, запаковані в пакет у комплекті з одноразовими катетерами та рукавичками.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне, недоступне для дітей місце, за температури від 15 до 25 °C.
Термін придатності – 2 роки.

Окситоцин

(розчин для ін'єкцій)



окситоцин — 10 МО

Призначається при: гіпотонії матки (первинній, вторинній), атонії матки, видаленні плаценти, затримці посліду, стимуляції інволюції матки, післяродовій агалакції, піометрії.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Основною фармакологічною властивістю препарату є здатність викликати сильні скорочення м'язів матки. Ця дія пов'язана з впливом окситоцину на мембрани клітин міометрію. Під дією окситоцину посилюється проникність мембрани для іонів калію, знижується потенціал та підвищується збудження. Окситоцин підвищує секрецію молока, посилює вироблення лактогенного гормону передньої долі гіпофісу (пролактину).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Застосовувати під наглядом ветеринарного лікаря в дозах:

Вид тварин	Спосіб введення та дози (ОД)		
	Підшкірно або внутрішньом'язово	Внутрішньовенно	Епідурально
Кобили та корови	30–60	20–40	15–30
Свиноматки до 200 кг	30	20	10–15
Кози, вівці	10–15	8–10	-
Собаки	5–10	2–7	-
Коти	3	2	2

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати при слаборозкритій шийці матки або неправильному положенні плода. Окситоцин не сумісний з фібринолізином, норадреналіном, метеразином, варфарином натрію. Період виведення (каренції) не визначається.

ФОРМА ВИПУСКУ

Скляні ампули або флакони по 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 см³.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне місце за температури від 2 до 25 °С. При використанні першої дози з флакону препарат слід зберігати за температури від 2 до 8 °С та використати протягом тижня.

Термін придатності – 2 роки.

Ветсурфагон

(розчин для ін'єкцій)



сурфагон — 0,005 мг

Лікування гіпофункції яєчників та фолікулярних кіст. Для підвищення запліднюваності маточного поголів'я сільськогосподарських тварин, попередження ембріональної смертності при перегулах корів, ранньої індукції статевого циклу.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Препарат стимулює виділення гонадотропінів гіпофізом максимум через 2-3 години після введення. Підвищений вміст гонадотропінів в крові зберігається протягом 4-5 годин після введення. На відміну від природного люлеберину, біологічна активність препарату в 50 разів більша, що дозволяє використовувати цей препарат у мікродозах та короткими курсами. Препарат повільніше, ніж природній люлеберин, розкладається під впливом дії ферментів, що забезпечує сильнішу біологічну дію на гіпофіз.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Препарат вводять внутрішньом'язово.

- Для ранньої індукції статевого циклу препарат вводять одноразово в дозі 50 мкг на 8-12 день після отелу. Осіменіння тварин проводять не раніше ніж через 45 днів після отелу.
- Для лікування легкої форми гіпофункції яєчників препарат вводять дворазово: перший раз — на 8-12 день статевого циклу в дозі 50 мкг, другий раз — через 10 діб в дозі 10-25 мкг.
- При вираженій формі гіпофункції яєчників на 1, 3, 5 дні вводять внутрішньом'язово 10 мл 1% олійного розчину прогестерону, на 7 день вводять ветсурфагон в дозі 50 мкг.
- Для лікування фолікулярних кіст у корів препарат вводять 3 рази з інтервалом 24 години в дозі 25 мкг, на 11 день після першого введення препарату, вводять естрофан в дозі 250 мкг двічі з інтервалом 10-12 годин.
- З метою попередження ранньої ембріональної смертності препарат вводять одноразово в дозі 50 мкг на 8-12 день після осіменіння для підвищення функціональної активності жовтого тіла вагітності.
- При двох або більше перегулах корів на 10-14 день статевого циклу внутрішньом'язово двічі з інтервалом 10-12 годин вводять естрофан у дозі 250 мкг.
- На початку охоти або через 70 годин після введення естрофану вводять 50 мкг ветсурфагону після чого тварин осіменяють. На 8-12 день після осіменіння введення ветсурфагону в дозі 50 мкг повторюють.

- Для підвищення запліднюваності свиноматок через 24-48 годин після відлучення поросят тваринам вводять 100 МО СЖК або ГСЖК та через 56 годин вєтсурфагон в дозі 50 мкг.
- Осіменіння свиноматок проводять згідно інструкції.
- З метою підвищення запліднюваності вівцематок препарат вводять в дозі 12-15 мкг.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застосовувати під наглядом ветеринарного лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ

Ампули по 1, 2, 5, 10, 20 мл.

Скляні флакони, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 5, 10, 15, 20, 50, 100, 450 мл.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

В сухому, темному місці за температури від 0 до 10 °С.

Термін придатності — 2 роки.

Геоміцин ВЕТ

(піноутворюючі таблетки для внутрішньоматкового застосування)



окситетрацикліну гідрохлорид — 1,0 г

Профілактика гінекологічних захворювань та лікування корів, кобил, свиноматок при запальних процесах в матці після родової допомоги, оперативного відділення посліду, абортів, при ускладнених і патологічних родах, при гострих післяродових ендометритах.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Володіє широким спектром дії проти грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів, а саме: *Clostridium spp.*, *Actinomyces pyogenes*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *E. coli*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Bacillus spp.*, *Brucella spp.*, *Moraxella spp.*, *Salmonella spp.* Він також активний проти мікоплазм (*Mycoplasma spp.*), рикетсій (*Rickettsia spp.*), хламідій (*Chlamydia*) та деяких найпростіших. Завдяки піноутворюючій основі, діюча речовина таблеток рівномірно розподіляється по слизовій оболонці матки. Виділяється двоокис вуглецю, підсилює резорбцію окситетрацикліну, сприяє проникненню його в більш глибокі шари ендометрію.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Препарат застосовують внутрішньоматково. Перед застосуванням препарату проводять санацію зовнішніх статевих органів, при необхідності звільняють порожнину матки від запального ексудату при його великій кількості (особливо при гнійно-катаральних ендометритах) шляхом промивання фізіологічним розчином. На руку надягають рукавичку для ректальної фіксації шийки матки і обережно через шийку вводять таблетку в порожнину матки. З профілактичною метою препарат застосовують одноразово по 1 таблетці. Для лікування бактеріальних гінекологічних захворювань використовують 1 - 2 таблетки на тварину з інтервалом 48 годин.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 1 добу після останнього введення препарату. Для молока період виведення становить 0 днів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги, які містять 1 таблетку та пакетик з силікагелем, упаковані по 10 штук у картонну коробку.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне, недоступне для дітей місце, за температури до 25°C.
Термін придатності – 18 місяців.

Рукавички поліетиленові

поліетилен



РУКАВИЧКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ РАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ДОВЖИНОЮ 90 СМ

Для ректального дослідження та штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. Виготовлені з м'якої поліетиленової плівки, забезпечує збереження відчуття дотику.

РУКАВИЧКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ РАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ДОВЖИНОЮ 35 СМ

Лічені секунди витрачаються при одяганні і знятті з рук. Тонка плівка зберігає тактильну чутливість пальців. Герметичний шов захищає від попадання води і пилу. Застосовуються в лабораторіях, складських приміщеннях, виробничих цехах, де необхідно зберігати руки від вологи і агресивних середовищ, при дослідженні і контакті з дрібними тваринами, щоб запобігти зоонозних хвороб, при наданні ветеринарної допомоги тваринам, в побуті.

ПРОТИМАСТИТНІ ПРЕПАРАТИ

Ветамаст

(суспензія для інтрацистерального застосування)



енрофлоксацин — 200 мг
неоміцину сульфат — 200 мг
преднізолон — 10 мг



Лікування корів у період лактації при різних формах маститів, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до складових препарату.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Комплексний протимікробний препарат, що володіє високою антибактеріальною активністю щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, також проявляє протизапальну дію. Застосовується для лікування маститів у лактуючих корів.

- **Енрофлоксацин** належить до антибіотиків групи фторхінолонів, має широкий спектр антибактеріальної дії. Активний відносно більшості грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, в т.ч. *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium perfringes*, *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter spp.*, *Corynebacterium pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, *Mycoplasma spp.*
- **Неоміцину сульфат** – антибіотик, що відноситься до підгрупи неоміцину групи природних аміноглікозидів, що утворюються актиноміцетами. Неоміцину сульфат активний щодо більшості грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, у тому числі резистентних до інших антибіотиків (пеніцилін, левоміцетин, тетрациклін).
- **Преднізолон** - синтетичний ГКС, дегідратований аналог гідрокортизону. Проявляє протизапальну, десенсибілізуючу і антиалергічну дію, а також володіє протишоковими і антитоксичними властивостями.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Вміст однієї шприц-туби вводять в уражену чверть молочної залози, яку попередньо видоюють і дезінфікують. Після введення препарату чверть молочної залози масажують для рівномірного розподілу його по всій цистерні. Повторне введення через 24 години протягом 3-5 діб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 7 діб після останнього введення препарату. Термін вживання молока в їжу людям встановлений через 3 доби після останнього введення препарату.

ФОРМА ВИПУСКУ

Полімерні шприц-туби по 10 мл.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце, за температури від 15 до 25 °С. Термін придатності – 2 роки.

Ветаклокс

(суспензія для інтрацистерального застосування)



кловсациліну бензатинова сіль — 500 мг.



Профілактика та лікування у корів в період сухою клінічних та субклінічних маститів, що спричинені мікроорганізмами чутливими до кловсациліну.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Антибактеріальні препарати для інтрацистерального введення.

Кловсацилін – напівсинтетичний антибіотик пеніцилінового ряду, активний щодо грамнегативних, та грампозитивних мікроорганізмів (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Corynebacterium pyogenes*, *Neisseria spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*). Препарат діє бактерицидно, перешкоджаючи синтезу зовнішньої оболонки клітинної мембрани мікроорганізму.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Після останнього здоювання вміст однієї шприц-туби ввести в кожну чверть молочної залози, яку попередньо видоюють і дезінфікують. Після введення препарату чверть молочної залози масажують для рівномірного розподілу його по всій цистерні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовувати лактуючим коровам та тваринам у яких сухостійний період менший 4 тижнів. Забій тварин на м'ясо дозволяється через 28 діб після останнього введення препарату. Термін вживання молока в їжу людям встановлений через 96 годин після отелення. У випадку коли отелення відбулось раніше 28 доби після введення препарату, термін вживання молока встановлений через 28 діб та 96 годин після лікування.

ФОРМА ВИПУСКУ

Полімерні шприц-туби по 4,5 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне, недоступне для дітей місце, за температури від 15 до 25 °С. Термін придатності – 2 роки.

ПРОТИМАСТИТНІ ПРЕПАРАТИ

Ветаксимін

(суспензія для інтрацистерального застосування)



рифаксимін — 200 мг



Лікування корів, хворих на мастити у сухостійний період, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до рифаксиміну, а також попередження їх.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Рифаксимін - антибіотик широкого спектру дії, що належить до групи анзаміцинів. Він порушує синтез РНК в бактеріальній клітині, зв'язується з бета-субодиницею ДНК-залежної РНК-полімерази, перешкоджаючи її приєднання до ДНК, і пригнічує транскрипцію РНК. Спектр дії рифаксиміну включає основні бактерії, які викликають мастит у корів: *Staphylococcus aureus* (включаючи стійкі до пеніциліну елементи), *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Actinomyces pyogenes*.

Фармакокінетичні дослідження показують, що рифаксимін практично не всмоктується з епітелію вимені, що створює легку доступність рифаксиміну в обробленій чверті молочної залози.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Після останнього доїння вміст однієї шприц-туби ввести через дійковий канал в кожну чверть молочної залози, яку попередньо видоюють і дезінфікують. Після введення препарату чверть молочної залози масажують для рівномірного розподілу його по всій цистерні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо та споживання молока дозволяють без обмежень.

ФОРМА ВИПУСКУ

Полімерні шприц-туби по 5 мл.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце, за температури від 10 до 25 °С. Термін придатності – 2 роки.

Цефаловет

(суспензія для інтрацистернального застосування)



цефалексин — 200 мг

Лікування корів у період лактації при клінічній та субклінічній формах маститів бактеріальної етіології, що спричинені мікроорганізмами чутливими до цефалексину.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Антибактеріальний препарат для інтрацистернального застосування.

Цефалексин - антибіотик першого покоління, що має широкий спектр бактерицидної дії проти багатьох грампозитивних та грамнегативних бактерій (*Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Klebsiella spp.*).

Після інтрацистернального введення активні речовини швидко розподіляються по всій молочній залозі. Активні речовини практично не абсорбуються з молочної залози в системний кровообіг, не біотрансформуються та виділяються практично в незмінному вигляді з молоком. Максимальна концентрація препарату в крові досягається протягом 1–2 годин.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Вміст однієї шприц-туби вводять в уражену чверть молочної залози, яку попередньо видоюють і дезінфікують. Після введення препарату чверть молочної залози масажують для рівномірного розподілу його по всій цистерні. Препарат вводять два рази на добу з інтервалом 12 годин. Курс лікування – 2 доби.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 4 доби після останнього введення препарату. Термін вживання молока в їжу людям встановлений через 2 доби після останнього введення препарату.

ФОРМА ВИПУСКУ

Полімерні шприц-туби по 10 мл.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне, недоступне для дітей місце, за температури від 15 до 25 °С. Термін придатності - 2 роки.

Лінімент бальзамічний за Вишневським

дьоготь березовий — 3,0 г

ксероформ — 3,0 г



Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, собак при захворюваннях шкіри і слизових оболонок (ранах, виразках, пролежнях).

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Препарат має антимікробну дію, ефективний по відношенню щодо багатьох грам-позитивних (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*) та грамнегативних коків (*Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitides*), багатьох бактерій (*Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Serratia spp.*, *Proteus stuartii*, *Yersinia spp.*). Лінімент має адсорбуючу і в'яжучу дію, слабо подразнює рецептори тканин, сприяє процесу регенерації.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Лінімент застосовують у вигляді пов'язок, аплікацій та тампонів. На місце ураження після очищення від шерсті, сторонніх предметів, ексудату, некротичних тканин або після хірургічної обробки накладають марлеві серветки, просочені лініментом. Зверху накладають фіксуючу пов'язку з гігроскопічним шаром (компресний папір, пергамент або клейонка). Заміну пов'язок проводять через 2-3 доби. При відкритому методі лікування на рани, виразки, пролежні після ретельної санітарної обробки наносять лінімент тонким шаром 2-3 рази на добу. Рани, що мають малі поверхні, але глибокі канали, тампонують марлевими серветками, просоченими лініментом.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Гостра мокнуча екзема.

При індивідуальній чутливості тварин до складників препарату можливі подразнення шкіри.

ФОРМА ВИПУСКУ

Туби алюмінієві по 40, 45, 115 і 120 г.

Контейнери полімерні по 20, 50, 100, 200, 450, і 900 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігають препарат у сухому темному місці за температури від 0 до 20 °С.

Термін придатності - 5 років.

Мазь бактерицидно-акарицидна «ЯМ»

кислота саліцилова — 5 г
оксид цинку — 10 г
сірка — 10 г
дьоготь березовий — 10 г



Для місцевого застосування при лікуванні тварин у комплексі терапевтичних заходів. Лікування у тварин трихофітії (стригучого лишая), екзем, дерматитів та інших захворювань шкіри, уражень копит і ратиць при некробактеріозі, копитної гнилі в овець.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Препарат має фунгіцидні властивості щодо *Trichophyton*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum* та бактерицидні властивості відносно *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Brucella spp.*, *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella popo*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Corynebacterium*, а також протизапальні властивості.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Зовнішньо. Мазь наносять тонким шаром, злегка втираючи, на уражені ділянки шкіри та 2-4 см навколо них. Перед нанесенням мазі уражену ділянку очищують від шерсті, сторонніх тіл, ексудату, некротичних тканин. Уражені ділянки обробляють 1-2 рази на добу протягом 4-5 діб. Якщо через 4-5 діб лусочки не відшарувались, втирання мазі продовжують. Через 7-10 діб уражені ділянки звільняються від лусочок і на них спостерігається ріст шерсті.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Гострий перебіг захворювання (гнійні процеси).
При індивідуальній чутливості тварин до складників препарату можливі подразнення шкіри.

ФОРМА ВИПУСКУ

Туби алюмінієві по 40, 45, 115 і 120 г.
Контейнери полімерні по 20, 50, 100, 200, 450, і 900 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне місце за температури від 0 до 25 °С.
Термін придатності - 5 років.

Мазь іхтіолова

іхтіол — 10 г



Лікування великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, м'ясоїдних (собак, котів) при захворюваннях шкіри (опіки, рани, екземи, дерматити, фурункульоз, піодермії), артритях, невралгіях, бурситах.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мазь має антисептичну, протизапальну, кератопластичну і місцево-знеболювальну дії. Після нанесення на рани і слизові оболонки, крім антисептичної дії, звужує судини, зменшує секрецію і ексудацію, діє знеболююче і прискорює регенерацію тканин.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Мазь застосовують зовнішньо у вигляді пов'язок, аплікацій та тампонів. Після ретельного очищення від шерсті, сторонніх предметів, ексудату, некротичних тканин або після гігієнічної обробки ураженої ділянки тіла, наносять рівномірним шаром мазь 1-2 рази на добу, до зникнення ознак захворювання. Кількість мазі залежить від площі ураженої частини тіла, в середньому використовують 5-10 г.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовувати з обережністю для тварин з підвищеною чутливістю до іхтіолу.

ФОРМА ВИПУСКУ

Туби алюмінієві по 40, 45, 115 і 120 г.

Контейнери полімерні по 20, 50, 100, 200, 450, і 900 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У сухому темному місці за температури від 15 до 25 °С.

Термін придатності - 5 років.

Мазь окситетрациклінова 1%

окситетрацикліну гідрохлорид — 1 г



Лікування великої рогатої худоби, овець, коней, свиней, собак та котів, хворих на кон'юнктивіт, блефарит, кератит, а також при інфікованих ранах, екземах, гнійних захворюваннях шкіри, трофічних виразках, виразках рогівки та інших захворюваннях очей.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Має широкий спектр антимікробної дії проти грампозитивних та грамнегативних бактерій (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Brucella spp.*, *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Klebsiella spp.*), а також актиноміцетів (*Actinomycetes spp.*), протозойних (*Protozoa spp.*), спірохет (*Spirochaetaceae spp.*), рикетсій (*Rickettsia spp.*), мікоплазм (*Mycoplasma spp.*) і хламідій (*Chlamydia spp.*).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

При лікуванні захворювань очей мазь наносять за нижню повіку 3 рази на добу. При лікуванні захворювань шкіри мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки та на 2-4 см навколо них, перед нанесенням уражену ділянку ретельно очищують від сторонніх тіл, ексудату, некротизованих тканин. Обробляють 1-2 рази на добу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Мазь не рекомендують застосовувати одночасно із пеніцилінами, цефалоспоринами, хінолонами та циклосерином.

ФОРМА ВИПУСКУ

Туби алюмінієві по 40, 45, 115 і 120 г.
Контейнери полімерні по 20, 50, 100, 200, 450 і 900 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухе, темне місце за температури від 5 до 25 °С.
Термін придатності - 5 років.

Мазь цинкова 10%

цинку оксид — 10 г



Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, кіз, свиней, собак, котів при дерматиті, піддермії, екземі, виразок шкіри з явищами екструдації.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Протимікробна, в'яжуча, підсушуюча дії препарату зумовлені цинку оксидом. Засіб на поверхні шкіри утворює альбумінати та денатурує білки. Плівка, що при цьому утворюється, захищає нервові закінчення від подразнення і відчуття болю слабшає. Відбувається місцеве звуження судин, зниження їх проникності, зменшення ексудації, що попереджує розвиток запального процесу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Застосовують зовнішньо. Мазь наносять тонким шаром на уражені ділянки шкіри та 2-4 см навколо, злегка втираючи. Обробляють 1-2 рази на добу. Перед нанесенням мазі поверхню шкіри очищають від бруду, залишків ексудату, шерсті.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Гострі гнійні процеси.

ФОРМА ВИПУСКУ

Туби алюмінієві по 40, 45, 115 і 120 г.
Контейнери полімерні по 20, 50, 100, 200, 450 і 900.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Темне, сухе місце за температури від 0 до 25 °С.
Термін придатності - 2 роки.

Присипка для інфікованих ран

(порошок для нанесення на шкіру)

йодоформ — 10 г

стрептоцид — 15 г

борна кислота — 15 г



Лікування великої рогатої худоби, овець, коней, свиней, м'ясоїдних (собаки, коти) при дерматологічних захворюваннях шкіри (екземи, дерматити, рани гнійні та післяопераційні).



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Препарат має антисептичну, в'яжучу, підсушуючу дії. Його дія зумовлена фармакологічними властивостями складників.

- **Йодоформ** не вступає в реакцію з органічними речовинами, але за певних умов з нього утворюється активний йод. Це відбувається під впливом світла, кисню повітря, оксигемоглобіну і особливо тканинних рідин, птомаїнів та мікробів. Цей процес відбувається повільно, тому йод виділяється довго (2-3 год.). Йод руйнує продукти розпаду та інші шкідливі речовини, включаючи токсини, стимулює утворення грануляції. Альбумінати йоду, що утворюються на поверхні рани діють в'яжуче, що в поєднанні з розсмоктуючою дією веде до зменшення екструзії та обмеження запалення
- **Стрептоцид** має широкий спектр дії на грампозитивні та грамнегативні бактерії (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Brucella spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Corynebacterium*, *klebsiella spp.*).
- **Кислота борна** виявляє бактеріостатичну дію та слабку подразнюючу дію на грануляційні тканини.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Препарат наноситься зовнішньо. Перед нанесенням уражену ділянку очищують від шерсті, сторонніх тіл, ексудату, некротичного матеріалу. Припудрюють присипкою (3-5 г) уражені ділянки шкіри та 2-4 см навколо них. Обробку проводять 1-2 рази на добу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовувати з обережністю для тварин з підвищеною чутливістю до йодоформу, при тривалому застосуванні може викликати подразнення шкіри та слизових оболонок.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пакети з алюмінієвої фольги по 10, 50, 100, 200, 500 г.
Поліетиленові пакети по 10, 50, 100, 200, 500 г.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суше, темне місце за температури від 15 до 20 °C
Термін придатності - 2 роки.

Вакцина антирабічна рідка інактивована для імунізації тварин **Рабістар ред**

Одна доза (1 мл) містить інактивований антиген проти сказу, штам SAD Vnukovo-32, з активністю не менше 2 МО та алюмінію гідроксид у якості ад'юванта.



Вакцину застосовують для профілактичної та вимушеної вакцинації тварин проти сказу.



ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Вакцинний вірус сприймається організмом тварин як чужорідний агент та активізує імунну систему на вироблення вірус нейтралізуючих антитіл. Після одноразового застосування вакцини захисний рівень антитіл досягається на 14 день і утримується на високому рівні не менше року.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Вакцину вводять внутрішньом'язово або підшкірно у дозі 1 см³.
Схема профілактичної вакцинації тварин

Види тварин	Мінімальний вік для вакцинації			Повторное введення	Ревакцинация
М'ясоїдні	Від вакцинованих самок	з 3 місяців		Через 12 місяців	Кожні 24 місяці
	Від не вакцинованих самок	з 1 до 3 місяців		Через 12 місяців	Кожні 24 місяці
Коні	з 6-ти місяців			Через 12 місяців	Кожні 24 місяці
	Молодше 6-ти місяців	Від вакцинованих самок	з 4 місяців	Через 1 місяць після 1-го введення	Кожні 24 місяці
		Від не вакцинованих самок	з 2 місяців		
Жуйні	Більше 9 місяців		з 9 місяців	Через 12 місяців	Кожні 24 місяці
	Молодше 6 місяців	Від вакцинованих самок	з 4 місяців		
			Від не вакцинованих самок	с 2 місяців	Обов'язково у віці з 9 до 12 місяців

СХЕМА ВИМУШЕНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ ТВАРИН

Вид тварин	Перше введення	Друге введення	Третє введення	Четверте введення
М'ясоїдні, коні, жуйні, свині.	Не пізніше ніж 24-36 годин з моменту можливого інфікування	Через 12 годин після першого введення	Через 12 годин після першого введення	Через 14-16 діб

Примітка:

- для м'ясоїдних, коней, жуйних можливе щорічне проведення ревакцинації, в залежності від епізоотичної ситуації на території або законодавства держави;
- при проведенні вимушеної вакцинації тварин, підозрілих на зараження сказом, обов'язково потрібно проводити комплекс заходів відповідно до «Інструкції про заходи щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин».

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не вакцинувати клінічно хворих тварин.

Не змішувати з іншими вакцинами або імунологічними препаратами.

- Перед застосуванням вакцину ретельно збовтати і довести температуру препарату до кімнатної від 15 до +25 °С;

- Вакцинованих тварин не слід тренувати або піддавати фізичним навантаженням протягом одного тижня після вакцинації.

Період виведення (каренції) - нуль днів.

Із загальних міркувань не слід вакцинувати тварин протягом останніх 2 тижнів вагітності (маніпуляції, неспокій, поява антитіл тощо.).

ФОРМА ВИПУСКУ

Скляні флакони, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 1,0 см³; 2,0 см³; 3,0 см³; 5,0 см³; 6,0 см³; 10,0 см³ або ампули по 1,0 см³; 2,0 см³; 3,0 см³; 5,0 см³; 6,0 см³; 10,0 см³ в термоконтейнері (пінополістеролова коробка) або коробці з картону.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

В захищеному від світла місці за температури від 2 до 8 °С.

Не заморожувати.

Термін придатності - 24 місяці.

Вакцина антирабічна для пероральної імунізації м'ясоїдних тварин «Орісвак»

1 доза містить 1,8 мл антигену SAD Bern 108,0 TCID₅₀ в полімерному блістері; поживну принаду з харчових та атрактивних компонентів; біологічний маркер (антибіотик тетрациклінового ряду) не менше 0,150 г/принаду.



Профілактична вакцинація м'ясоїдних тварин проти сказу.

ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Після прокушування полімерного блістера всередині поживної принади вакцинний вірус потрапляє на слизову оболонку порожнини рота і піднебінної мигдалини. Організм вакцинованої особини розпізнає вірус як чужорідне тіло, поверхневий глікопротеїн G оболонки вірусу сказу активує імунну систему на вироблення віруснейтралізуючих антитіл та формує проєктивний імунітет. Внаслідок цього тварини отримують захист від інфікування вірулентним польовим вірусом сказу та не поширюють сказ. Формування імунітету у вакцинованих тварин складає 21 день і триває мінімум 1 рік

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Вакцину застосовують два рази на рік, розповсюджуючи вручну або з авіатранспорту. Використовують не менше 20 доз вакцини на 1 км², в залежності від епізоотичної ситуації та щільності популяції цільових видів тварин. При розповсюдженні вакцини авіатранспортом через однакові відстані формують квадрати на картах, наприклад, 250-500 x 250-500 метрів. При цьому можливе додаткове ручне застосування вакцини в місцях безпосереднього проживання тварин (нори), з розрахунку 10 принад на одну нору.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не застосовується продуктивним тваринам.

ФОРМА ВИПУСКУ

Поживна принада, в якому розміщено блістер з антигеном. Коробки з картону по 48 доз або ящики з гофрованого картону 160, 320, 600-800 доз.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в морозильній камері в темному місці при температурі мінус 20 °C або нижче. Транспортування вакцини для подальшого зберігання здійснюється за температури мінус 20 °C або нижче, а для подальшого використання та зберігання під час розкладки в польових умовах за температурі від 2 до 8 °C не більше 3 місяців.

Хлорсепт

(хлорні таблетки для дезінфекції)

натрієва сіль дихлорізоціанурової
кислоти — 80 - 82%

Препарат застосовується для дезінфекції тваринницьких і птахівничих приміщень, обладнання в них, приміщень утримання тварин і птиці, приміщень для зберігання та підготовки кормів, транспортних засобів, ветлікарень, ветпунктів, лабораторій, виробів ветеринарного призначення, заповнення дезінфекційних бар'єрів, дезінфекції санітарно-технічного обладнання



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Препарат має бактерицидну, віруліцидну, фунгіцидну, спорицидну дію по відношенню до:

- грамнегативних та грампозитивних бактерій: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus subtilis* (вегетативна та спорова форма), *Bacillus cereus* (вегетативна та спорова форма), *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella typhimurium*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterococcus faecalis*;
- вірусів: *Newcastle disease virus* (Rubulavirus), *Aujeszký's disease* (Varicellovirus), *Bovine coronavirus* (Betacoronavirus);
- грибів: *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Для приготування робочих розчинів засобу «Хлорсепт» відповідної концентрації виходять із наступних розрахунків (табл. 1).

Препарат добре розчинний у воді, тому вода не потребує попередньої підготовки (підігріву, додавання допоміжних речовин, тощо), також немає обмежень щодо матеріалу ємностей.

Робочі розчини препарату готують безпосередньо перед проведенням дезінфекції.

Дезінфекцію засобом «Хлорсепт» проводять наступними методами:

- протирання ганчір'ям або чищення щіткою, змоченими у робочому розчині з розрахунку 100 мл/м²;
- зрошення робочим розчином засобу із гідропульта, автомакса, розпилювача типу «Квазар» з розрахунку 100 мл/м²;
- аерозольним методом з термооприскувачів (туманогенераторів), моторозпилювачів або ранцевих (ручних) обприскувачів із розрахунку 10 мл/м²;
- занурення у розчин, замочування у розчині, заповнення розчином, додавання маточного розчину або таблеток засобу у воду.

Табл. 1 Приготування робочих розчинів засобу «Хлорсепт»

Концентрація розчинів засобу (за активним хлором), %	Необхідна кількість таблеток на 10 л води
0,015	1
0,030	2
0,045	3
0,060	4
0,100	7
0,200	14
0,300	20

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Під час роботи забороняється вживати їжу, пити, курити. При проведенні робіт з дезінфекції слід уникати розбризкування розчинів та попадання засобу в очі, на шкіру. Після закінчення роботи, обличчя та руки необхідно вимити водою з милом. Роботи з приготування та застосування робочих розчинів засобу слід проводити у захисному одязі, з використанням засобів захисту шкіри, органів дихання та очей.

ФОРМА ВИПУСКУ

Пластиковий контейнер, що містить 6 таблеток.
Пластикові банки по 1 кг.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в тарі виробника за температури від 0 до 30°C у темних, критих, сухих складських приміщеннях з відносною вологістю не більше 80 % (при 25°C), окремо від харчових продуктів та у місцях, недоступних для дітей. Засіб не втрачає своїх властивостей при мінусовій температурі.
Термін придатності – 2 роки.

Біоцид Сандез

(розчин для дезінфекції)

дидецилдиметиламонія хлорид - 2,0%

дидецилдиметилбензиламонія хлорид - 10,0%

глутаральдегід - 10,0%

ізопропанол - 10,0%

Препарат застосовується для миття та дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, інкубаторіїв, пунктів штучного осіменіння, транспортних засобів, поверхонь, об'єктів і обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду, для заповнення дезбар'єрів.



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Препарат має бактерицидну дію до грамнегативних та грампозитивних бактерій (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *E.coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterococcus faecalis*, *Salmonella typhimurium*), включаючи спороутворюючі форми: *Bacillus subtilis*, фунгіцидну дію (*Candida albicans*, *Aspergillus niger*), та віруцидну дію (вірус грипу А H1N1 (родина *Orthomyxoviridae*), *Aujesky's disease* (родина *Herpesviridae*), *Bovine coronavirus* (родина *Coronaviridae*).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Дезінфекцію проводять після ретельної механічної та санітарної очистки поверхонь об'єктів знезараження.

Для дезінфекції використовують водні розчини препарату.

- Для профілактичної дезінфекції використовують 0,2 %-ний водний розчин препарату при нормі витрати 0,2-0,25 л на 1 м² площі. Експозиція складає 30 – 60 хвилин.

- Для вимушеної дезінфекції при інфекційних захворюваннях бактеріальної та вірусної етіології та заключної дезінфекції використовують 0,5%-ний водний розчин препарату при нормі витрати 0,2-0,25 л на 1 м² площі. Експозиція складає 60 - 120 хвилин.

- Для знезараження поверхонь за режимом туберкульозу використовують 0,75 %-1,0 % розчини препарату (75–100 мл препарату на 10 л води). Експозиція складає від 3 до 6 годин.

- Для заключної дезінфекції методом туманоутворення використовують водний розчин препарату (0,6 л препарату + 4 л води /1000м³ об'єму). Робочий розчин розпилюють при вимкнутій вентиляції з часом експозиції – 2–3 години.

- Для дезінфекції методом піноутворення застосовують 0,5 %-ний водний розчин препарату з розрахунку 1 л робочого розчину на 3 – 4 м² площі. Для обробки приміщень, обладнання чи транспорту піною необхідно використовувати піноутворюючу насадку.

- В присутності тварин та птиці та для обробки інкубаційних яєць використовують 0,1 %-ний водний розчин препарату. Застосовують методом розпилення (з розрахунку 1л робочого розчину на 3 – 4 м² площі) та туманоутворення (4 л 0,1 %-ного розчину на 1000 м³ приміщення).

- Для заповнення дезбар'єрів та дезкилимків використовують 0,5 % водний розчин засобу. Змінювати розчин по мірі забруднення або один раз на тиждень.

ЗАСОБИ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА ДЕРАТИЗАЦІЇ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При використанні препарату в термічному туманогенераторі з'являється гострий неприємний запах. Після обробки приміщення необхідно обов'язково провітрити. Не сумісний з милами, аніонними поверхнево-активними речовинами, концентрованими розчинами хлору, окисниками.

ФОРМА ВИПУСКУ

Каністри з поліетилену місткістю 1, 5, 10, 30 л.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в тарі виробника за температури від 5 до 25 °С у сухих темних добре вентильованих складських приміщеннях в захищеному від прямого сонячного випромінювання місці. Запобігати замерзанню.

Термін придатності – 3 роки.

Стоп-гризун

бромадіолон — 0,05 г

Приманка для знищення гризунів: щурів сірих (*R. Rattus*), мишей хатніх (*M. musculus*).



ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Діюча речовина принади бромадіолон - антикоагулянт кумаринового ряду другого покоління. Діє на синтез протромбіну та проникливість судин, що веде до порушення механізму згортання крові, викликаючи повільну загибель від кровотечі. Гризуни гинуть через 3-5 діб.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ

Принаду розкладають біля місць ймовірного розповсюдження гризунів. Для знищення гризунів на площі 250-300 м² принаду розкладають у 7-10 місцях, в одне місце кладуть 100-150 г (4-6 столових ложок) принади для знищення щурів, і 20-25 г (1 столова ложка) для знищення мишей.

Розкладені приманки періодично перевіряють і за потреби поповнюють до тих пір, доки вони не залишаться незайманими (при знищенні щурів не менше 10 діб, при знищенні мишей – 20 діб).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Приманку розкладають в місцях, які недоступні для дітей, сільськогосподарських і домашніх тварин. Препарат є токсичним для людей, тому до роботи з ним не допускаються особи, яким не виповнилося 18 років, вагітні жінки та жінки, які годують дітей, а також особи із захворюваннями. Особи, що працюють з приманкою, повинні пройти інструктаж по роботі з отруйними речовинами. Обов'язково користуватися засобами індивідуального захисту (халат, косинка, захисні окуляри, гумові рукавички). Не торкатися принади незахищеними руками. Після роботи руки ретельно вимити з милом.

ФОРМА ВИПУСКУ

Поліетиленові або паперові пакети по 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0 кг.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігають в упакованні виробника у сухому, прохолодному, закритому на ключ приміщенні, подалі від нагрівальних приладів за температури від 5 до 35°C. Термін придатності - 3 роки.

ДІАГНОСТИЧНІ НАБОРИ

НАБІР ДІАГНОСТИЧНИЙ «АЧС ПЛР-РЧ» для діагностики АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПЛР У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

- набір реактивів для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ампліфікації);
- набір контрольних зразків.

Використовується для діагностики африканської чуми свиней методом ПЛР у режимі реального часу, призначений для виявлення вірусної ДНК африканської чуми свиней (АЧС) в стабілізованій крові свиней, внутрішніх органах (селезінка, легені, лімфатичні вузли тощо), вірусомісній культуральній рідині методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу.



ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Використовується для *in vitro* діагностики. Набір діагностичний «АЧС ПЛР-РЧ» призначений для виявлення ДНК вірусу АЧС методом ПЛР у режимі реального часу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

В основі діагностичного набору «АЧС ПЛР-РЧ» для діагностики африканської чуми свиней методом ПЛР у режимі реального часу лежить виділення в досліджуваній пробі ДНК збудника й наступна ампліфікація специфічної ділянки ДНК вірусу АЧС з використанням специфічних олігонуклеотидних праймерів та ферменту Taq-полімерази. Детекція продуктів ПЛР здійснюється в режимі реального часу із використанням спеціального обладнання (ампліфікатори виробництва Qiagen, Applied Biosystems, BioRad, або подібних). Матеріалами для дослідження є: стабілізована кров свиней, внутрішні органи (селезінка, легені, лімфатичні вузли тощо), вірусомісна культуральна рідина.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З біологічними матеріалами слід поводитись, як із потенційно небезпечними.

ФОРМА ВИПУСКУ

Рідкі компоненти набору діагностичного фасують у пробірки з поліетилену високого тиску. Компоненти набору діагностичного пакують у поліетиленові пакети із застіркою або в картонні коробки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців від дати виготовлення. За умов правильного зберігання реагенти залишаються стабільними до закінчення строку зберігання. Забороняється застосовувати набір після закінчення терміну придатності або за умови недотримання температурного режиму зберігання. Зберігати та транспортувати діагностичний набір та реагенти в морозильній камері за температури мінус 20(±)2 °С.

НАБІР ДІАГНОСТИЧНИЙ «АЧС/КЧС ДУО ПЛР-РЧ» ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ АФРИКАНСЬКОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ МЕТОДОМ ПЛР У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

- набір реактивів для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ампліфікації);
- набір контрольних зразків.

Призначений для виявлення вірусної ДНК африканської чуми свиней (АЧС) та вірусної РНК класичної чуми свиней (КЧС) в стабілізованій крові свиней, внутрішніх органах (селезінка, легені, лімфатичні вузли тощо), продуктах переробки м'ясної сировини, вірусовмісній культуральній рідині та об'єктах навколишнього середовища методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу.



ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Використовується для *in vitro* діагностики. Діагностичний набір забезпечує виявлення ДНК вірусу африканської чуми свиней та РНК вірусу класичної чуми свиней методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

В основі діагностичного набору «АЧС/КЧС дуо ПЛР-РЧ» для диференційної діагностики африканської та класичної чуми свиней методом ПЛР у режимі реального часу лежить виділення в досліджуваній пробі ДНК та РНК збудника й наступна ампліфікація специфічної ділянки ДНК та РНК вірусів АЧС і КЧС з використанням специфічних олігонуклеотидних праймерів та ферменту Taq-полімерази. При цьому, детекція продуктів ПЛР здійснюється в режимі реального часу із використанням спеціального обладнання, такого як Rotor-Gene (Corbett Research), ABI Prism 7000 (Applied Biosystems), iQCyler (BioRad) або подібних.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З біологічними матеріалами слід поводитись, як із потенційно небезпечними.

ФОРМА ВИПУСКУ

Рідкі компоненти діагностичного набору фасують у пробірки типу «Eppendorf» з поліетилену високого тиску. Компоненти системи пакують у поліетиленові пакети із застілкою.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців від дати виготовлення. За умов правильного зберігання реагенти залишаються стабільними до закінчення строку зберігання. Забороняється застосовувати набір після закінчення терміну придатності або за умови недотримання температурного режиму зберігання. Зберігати та транспортувати діагностичний набір та реагенти в морозильній камері за температури мінус 20(±)2 °С.

ДІАГНОСТИЧНІ НАБОРИ

НАБІР ДІАГНОСТИЧНИЙ «CAPRIPOXVIRUS ПЛР-РЧ»

- набір реактивів для проведення ПЛР в реальному часі;
- набір контрольних зразків.

Набір діагностичний «Capripoxvirus ПЛР-РЧ» для виявлення ДНК вірусів роду *Capripoxvirus*, а саме вірусу нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, віспи овець та віспи кіз, методом ПЛР у режимі реального часу, призначений для виявлення ДНК вірусів роду *Capripoxvirus* в стабілізованій крові, змивах носової та ротової порожнин, шкірних вузлах (нодулах), внутрішніх органах (селезінка, легені, лімфатичні вузли тощо), вірусовмісній культуральній рідині методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу.



ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Використовують для діагностики *in vitro*. Набір діагностичний «Capripoxvirus ПЛР-РЧ» призначений для виявлення ДНК вірусів роду *Capripoxvirus*, а саме вірусу нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, віспи овець та віспи кіз, методом ПЛР у режимі реального часу.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Використовують для діагностики *in vitro*. Набір діагностичний «Capripoxvirus ПЛР-РЧ» для виявлення ДНК вірусів роду *Capripoxvirus*, а саме вірусу нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, віспи овець та віспи кіз, методом ПЛР у режимі реального часу, призначений для виявлення ДНК вірусів роду *Capripoxvirus* в стабілізованій крові, змивах носової та ротової порожнин, шкірних вузлах (нодулах), внутрішніх органах (селезінка, легені, лімфатичні вузли тощо), вірусовмісній культуральній рідині методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З біологічними матеріалами слід поводитись, як із потенційно небезпечними.

ФОРМА ВИПУСКУ

Рідкі компоненти діагностичного набору фасують у пробірки типу «Eppendorf» з поліетилену високого тиску. Компоненти набору діагностичного пакують у поліетиленові пакети із застібною або картонні коробки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців від дати виготовлення. За умов правильного зберігання реагенти залишаються стабільними до закінчення строку зберігання. Забороняється застосовувати набір після закінчення терміну придатності або за умови недотримання температурного режиму зберігання. Зберігати та транспортувати діагностичний набір та реагенти в морозильній камері за температури мінус 20(±)2 °С.

Наше підприємство пропонує Вам широкий вибір моделей медичного та робочого одягу, який виробляється з якісних тканин спеціального призначення.



Моделі можна купити як на складі готової продукції, так і замовити індивідуально.

За бажанням можливе нанесення на одяг вишивки та шевронів з логотипом Вашого підприємства.

КОСТЮМИ ТА ХАЛАТИ МЕДИЧНІ



РОБОЧИЙ ОДЯГ



КАМУФЛЯЖНИЙ ОДЯГ



НОТАТКИ

[illegible]



УкрВетПромПостач
UkrVetPromPostach



+38 (04594) 7 00 14
+38 (098) 444 73 55



e-mail: info@vetsnab.com.ua
www.vetsnab.com.ua



Україна, 07403, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Гельсінської гр. 23 А